

**FORMULAIRE
PHARMACEUTI
QUE À L'USAGE
DES HÔPITAUX
MILITAIRES, ...**







FORMULAIRE
PHARMACEUTIQUE,
A L'USAGE
DES HÔPITAUX MILITAIRES.

On trouve chez Méquignon Libraire à Paris,

Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, etc.
par MM. Corvisart, Le Roux et Boyer, profes-
seurs de l'Ecole de Médecine de Paris, faisant suite
à l'ancien Journal rédigé par MM. Kandermonde
et Roux. Cinquième année, an XIII, avec le Bul-
letin de l'Ecole et de la Société de Médecine, com-
posé de douze cahiers, chacun composé de six
feuilles grand in-8. Prix de l'abonnement pour
l'année, pour Paris. 15 fr.
et pour les départements, franc de port. . . 18 fr.

*On peut se procurer encore des exemplaires des
quatre années précédentes,*

Caden, Nouveau Dictionnaire de Chimie, 4 vol.
in-8. br. 24 l.

Bouillon - Lagrange, Manuel du Pharmacien,
in-8. br. 6 l.

Code des Médecins et des Pharmaciens in-18 br. 1 l. 16 s.

Farcy, Manuel du Chirurgien d'armée, in-12. br. 2 l.

Thérapeutique Chirurgicale trad. de Fallesmond,
in-8. br. 10 s.

Peyrille, Tableau d'un Cours d'Histoire natur. médi-
cale, nouv. édition augmentée, 2 vol. in-8. br. 9 l.

Portai, Cours d'anatomie médicale 5 vol. in-8. br. 36 l.

Leroy (Alphonse), Médecine maternelle, ou l'art d'é-
lever et de conserver les enfans, 1 v. in-8. br. 5 l. 10 s.

Leroy, Pronostics dans les maladies aiguës, in-8.
br. 5 l. 12 s.

Marck, Sur les Hémorrhoides fermées, traduit de
l'allemand. in-8. br. 5 l.

Oeuvres chirurgicales de Denault, nouv. édit. rédigée
et augmentée par Richat, 3 vol. in-8. fig. br. 15 l.

Traduction des oeuv. d'Hippocrate, 4 v. in-8. br. 20 l.

Baudeloque, Art des Accouchemens, 5^e édition
augmentée, 2 vol. in-8. fig. br. 14 l.

Du même, Principes sur l'Art des Accouchemens, en
laveur des Septuagèmes, in-12. fig. br. 4 l. 10 s.

Vautier, Traité du choix des Exutoires, trad. par
Curtat, 2 vol. in-8. br. 6 l.

FORMULAIRE PHARMACEUTIQUE, A L'USAGE DES HÔPITAUX MILITAIRES,

*Présenté par les Inspecteurs généraux du Service
de Santé des armées de terre,*

*Et approuvé par le Ministre-Directeur de
l'Administration de la Guerre.*

DRESDE, 1815.

Chez Charles Chrétien Meinkhold

L'apothicaire de la cour royale.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

RESEARCH REPORT

NO. 1

1950

CHICAGO, ILL.

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

AVANT-PROPOS.

En traçant ces Formules, on n'a eu d'autre motif que de présenter pour les hôpitaux militaires un modèle de précision et de simplicité qui rendit les prescriptions plus faciles, plus uniformes et d'une efficacité moins variable. La nature et l'Art fournissent des secours très-nombreux. Les médecins choisissent dans le catalogue qui suit le Formulaire, les moyens les plus appropriés à leurs vues et à leur expérience, et la pharmacie de l'hôpital auquel ils sont attachés sera approvisionnée en conséquence. Mais dans tous les cas où il sera possible de remplacer les remèdes exotiques par les indigènes, ils sont invités à les préférer, en attendant que l'art de guérir s'affranchisse tout-à-fait du tribut annuel qu'il paye à l'étranger.

C'est particulièrement dans les hôpitaux militaires qu'il faut prendre garde d'augmenter sans nécessité les formules; qu'il est infiniment salutaire d'en circons-

scrire le nombre, et sur-tout de les simplifier. Que les polypharmques se pénétrant bien de cette vérité, que les formules compliquées sont les enfans de l'ignorance, qu'on n'obtient de succès en médecine qu'en raison inverse de la multiplicité des remèdes qu'on prescrit, que les médicamens les plus efficaces ne sont absolument rien sans la méthode de les appliquer, et que le génie, dans beaucoup de circonstances, doit suppléer à tout.

TABLE

DES POIDS ET MESURES,

à l'usage du service de santé.

(Dans cette table les poids sont en nombres ronds pour évaluer les fractions.)

NOMENCLATURE NOUVELLE.	POIDS DE MARC.
Kilogramme.	2 livres poids de marc.
Demi-kilogramme. . . .	1 livre
Gramme.	$\frac{1}{8}$ grain.
Demi-gramme.	$\frac{1}{16}$ grain.
$\frac{1}{2}$ Gramme.	$\frac{1}{32}$ grain.
$\frac{1}{4}$ Gramme.	$\frac{1}{64}$ grain.
$\frac{1}{8}$ Gramme.	$\frac{1}{128}$ grain.
$\frac{1}{16}$ Gramme.	$\frac{1}{256}$ grain.
Décigramme.	$\frac{1}{20}$ grain.
Demi-décigramme. . . .	$\frac{1}{40}$ grain.
$\frac{1}{2}$ Décigramme et demi. .	$\frac{1}{8}$ grain.
$\frac{3}{4}$ Décigramme.	$\frac{3}{16}$ grain.
$\frac{5}{8}$ Décigramme.	$\frac{5}{32}$ grain.

Mesures de capacité en nombres ronds.

1 Litre.	1 pinte.
$\frac{1}{2}$ Litre.	$\frac{1}{2}$ chopine.
Quart de litre.	$\frac{1}{4}$ setier.
La cuiller à bouche. . . .	$\frac{1}{4}$ gros.
La cuiller à café.	$\frac{1}{8}$ gros.
La goutte.	$\frac{1}{16}$ grain.

TABLE

de ce qui est contenu dans ce Formulaire
pharmaceutique.

Avant-propos.	page 7
Table des poids et mesures à l'usage du service de santé.	vij

PREMIÈRE PARTIE.

MÉDICAMENS POUR L'USAGE INTERNE.

SECTION PREMIÈRE.

Des espèces.	pag. 1
Espèces pectorales.	<i>ibid.</i>
amères.	2
aromatiques.	<i>ibid.</i>
émollientes.	<i>ibid.</i>
anthelminthiques.	3
apéritives.	<i>ibid.</i>
sudorifiques.	<i>ibid.</i>
astringentes.	<i>ibid.</i>
valériennes.	4

SECTION II.

Boissons.	<i>ibid.</i>
Tisane commune.	<i>ibid.</i>
de résine de palme.	5
Tisane ou décoction de grains de lin.	<i>ibid.</i>

TABLE

ix

Tisane sudorifique,	pag 6
ou eau de riz,	ibid.
ou décoction blanche	ibid.
anti-scorbutique,	7
apéritive,	ibid.
fébrifuge ou décoction de quinquina	8
purgative, dite Royale,	ibid.
Infusion de saussurea,	ibid.
Infusion vulnéraire,	9
Oxyrat,	ibid.
Limonade avec l'acide de tartre,	ibid.
Limonade minérale,	ibid.
Emulsion,	10
Petit-Lait,	11
Bière apéritive,	ibid.
Eau gommeuse,	12
de tamaris,	ibid.
fébrifuge purgative,	ibid.
de goudron,	ibid.
martiale,	ibid.
anti-typhélique (liqueur Van-Swieten)	ibid.

SECTION III.

Vin médicinal,	14
Vin amer stomachique,	ibid.
antihémorrhagique ou d'absinthe,	ibid.
Fébrifuge ou de quinquina,	ibid.
anti-scorbutique,	ibid.
apérif,	15
martial,	ibid.
scillitique,	ibid.
moelle,	15

T A B L E.

SECTION IV.

Potions.	pag. 16
Potion purgative ordinaire.	ibid.
purgative majeure.	ibid.
purgative avec la manne.	ibid.
purgative avec la rhubarbe.	ibid.
vomitive avec l'antique.	17
vomitive avec l'ipécacuanha.	ibid.
cordiale.	ibid.
de Rivière.	ibid.
fibrofuge.	18
avec le quinquina.	ibid.
anti-spasmodique.	ibid.
anti-septique.	ibid.
anti-septique camphrée.	ibid.
avec le karnak.	19
pectorale.	ibid.
anodine.	ibid.
acidulée.	ibid.
diurétique.	20

SECTION V.

Sucs d'herbes.	ibid.
Le boucraiche, — la baglouse, — la chicorée sauvage, —	
le pissenlit, — la laitue, — le treille d'eau, — le	
creux de fontaine, — l'oseille, — la carchédia, —	
le hachabunga, — la gymetere, — le cerfeuil.	ibid.

SECTION VI.

Des poudres.	21
Poudre de réglisse.	ibid.

TABLE.

21

Poudre cathartique.	pag. 22
anthelmintique.	23
tempérante.	ibid.
absorbante astringe.	24

SECTION VII.

Bols.	ibid.
Bol purgatif.	ibid.
stomachique.	ibid.
anthelmintique.	ibid.
stomach.	25
calmant.	ibid.
de scirrhentique.	ibid.
antimonia.	ibid.

SECTION VIII.

Filices.	26
Filices scillitiques.	ibid.
anquenses.	ibid.
meicorielles.	27

DEUXIÈME PARTIE.

MÉDICAMENS POUR L'USAGE EXTERNE.

SECTION PREMIÈRE.

Cataplasmes.	28
Cataplasme émollient.	ibid.
anodin.	ibid.
récolant.	29

Cataplasme contre la gangrène.	pag. 24.
suppuratif.	ibid.
tonique.	ibid.
Sigapisme.	30
Vésicatoire extemporané.	ibid.
Usage du thymelæa ou géroen en vésicatoire.	ibid.

SECTION II.

Gargarisme.	34
Gargarisme adoucissant.	ibid.
désinfect.	ibid.
anti-résorcion.	ibid.
astringent.	35
anti-scorbutique.	ibid.
antiseptique.	ibid.

SECTION III.

Gallyraa.	35
Gallyre désinfect.	ibid.
résolutif.	ibid.

SECTION IV.

Lotions et fomentations.	36
Eau anti-porique.	ibid.
végéto-minérale.	38
Vin aromatique.	ibid.
Fomentation émolative.	ibid.
topique.	36

SECTION IV.

Linimens	pag. 36
Liniment apocis.	ibid.
ammoniacal.	ibid.
camphré.	ibid.
santonin.	37

SECTION V.

Injectiôns et lavemens.	ibid.
Injection émolliente.	ibid.
anti-septique.	ibid.
Lavement ordinaire.	ibid.
adoucissant.	38
astringent.	ibid.
laxatif.	ibid.
de tabac.	ibid.
purgatif.	39

Formules de quelques médicamens officinaux internes et externes, dont la plupart ne sont point décrites dans le Codex de la ci-devant Faculté de médecine de Paris, et qui, indépendamment des prescriptions magistrales, peuvent, au besoin, être préparés dans les établissemens civils et militaires.

Acétate de potasse liquide (terre solide de tartre)	ibid.
de soude liquide (terre solide minérale)	40
ammoniacal liquide (esprit de mandéracraïa).	41
de plomb liquide (extrait de saturne).	41
Acide tartareux.	42
Carbonaté de magnésie.	43
Magnésie pure.	44

Eau de chaux.	pag. 44
Eponges préparées.	45
Sirap d'extrait aqueux d'opium (diacode).	46
tatarique.	47
antispasmodique (ou de sublimé).	Ibid.
Onixol simple.	48
scillitique.	Ibid.
Considérations sur les Extraits.	49
Extrait de gentiane.	50
calmant d'opium.	50
de noix.	Ibid.
Teintures.	52
Tinctura de gentiane.	Ibid.
de coquel.	53
d'absinthe.	Ibid.
de raifort composé.	Ibid.
de quinquina.	Ibid.
de scilles.	53
vulnéraire (eau vulnéraire).	54
alcoolique de cantharides.	Ibid.
anodine de Sydenham ou Laudanum li-	
quide.	55
de myrthe.	Ibid.
Vinaigre scillitique.	56
Emplâtres.	Ibid.
Expiâtre simple.	Ibid.
mercurel.	57
jéchuim.	Ibid.
de ciguë.	58
de savon.	Ibid.
de savon camphré.	59
vésicatoire.	Ibid.
pour les hémorroïdes.	60

Emplâtre agglutinant.	pag. 60
Spasmod.	ibid.
Onguent.	61
Onguent anti-porique.	ibid.
Pommade anti-ophthalmique.	62
épurative,	ibid.
Onguent d'Ascua.	63
baillieux.	ibid.
de la mère.	64
de styrax.	ibid.
mercuriel.	ibid.
Gélat.	65
Récolte des plantes et des cantharides.	ibid.
Des cantharides.	70
De leur récolte.	71
De leur dessiccation.	72
De leur conservation.	ibid.
Moyens de maintenir et de rétablir la salubrité de l'air dans les hôpitaux.	74
Moyens de propreté.	75
Moyens mécaniques.	78
Troisième moyen.	81
Observations sur la conservation des médicaments officieux.	84
Observations sur la conservation des médicaments magistreaux.	87
Observations sur les médicaments externes confiés aux Elèves en chirurgie.	92
Tableau général des Médicaments simples et composés, dont l'usage est admis dans les hôpi- taux militaires fixes, temporaires et ambulans.	92
Etat des médicaments qui doivent composer une	

subdivision de pharmacie à la suite des ambulances, pour administrer les premiers secours	pag. 104
Modèle de cahier de visite.	105
Visite des herbes ou blauds du premier genéral.	106
Explication pour l'intelligence de ce modèle de cahier.	107
Instruction sur la Comptabilité des Pharmaciens.	103
Pièces justificatives des recettes.	114
des dépenses.	117
Mode d'établir la comptabilité.	120
Demandes en médicaments.	123
Dispositions générales.	125
Compte en valeur.	126

FORMULAIRE
PHARMACEUTIQUE
A L'USAGE
DES HÔPITAUX MILITAIRES.

PREMIÈRE PARTIE.

Médicaments pour l'usage interne.

SECTION PREMIÈRE.
DES ESPECES.

Espèces pectorales.

P	renez feuilles séchées	
	de capillaire,	} de chaque
	de scolopendre,	
	d'hysope,	
	fleurs de guimauve,	
	de rosulage,	} parties égales.

louches, mêlez et conservez pour l'usage.

A

FORMULAIRE

Espèces amères.

Prenez feuilles séchées
 de chamaedris, }
 de fumeterre, } de chaque
 de treille d'eau, } parties égales.
 de houblon, }
 accomodés de petite escar-
 réa, }

Incisez, mêlez et conservez pour l'usage.

Espèces aromatiques.

Prenez feuilles et fleurs séchées
 de sauge, }
 de mélisse, } de chaque
 de thym, } parties égales.
 de menthe poivrée, }
 de lavande, }
 d'hyssop.

Incisez, mêlez et conservez pour l'usage.

Espèces émoullientes.

Prenez feuilles séchées
 de sauge, }
 de guimauve, } de chaque
 de bouillon blanc, } parties égales.

Incisez, mêlez et conservez pour l'usage.

Espèces anthelminthiques.

Prenez feuilles et fleurs séchées

d'absinthe,	}	de chaque parties égales
de camomille ro-		
maine,		

Lavez, mêlez et conservez pour l'usage.

Espèces apéritives.

Prenez racines séchées

d'ache,	}	de chaque parties égales.
de fenouil,		
de persil,		
de fraiher,		
d'asperge,		

Coupez, mêlez et conservez pour l'usage.

Espèces sudorifiques.

Prenez bois de gayac épié,	}	de chaque parties égales.
racine de salispartille		
lupinée,		
échine coupée par tran-		
ches,		

Mêlez et conservez pour l'usage.

Espèces astringentes.

Prenez racines séchées

de bistorte,	}	de chaque parties égales.
de tormentille,		
écorce de grenade.		

Lavez, mêlez et conservez pour l'usage.

Espèces vulnérables.

Prenez feuilles et fleurs séchées

de lierre terrestre,	} de chaque partie égale.
de millepertuis,	
d'aigremoine,	
de menthe poivrée,	
de romarin,	
d'absouthé,	
de sauge,	+

faciez, mêlez et conservez pour l'usage.

Les plantes aromatiques, amères, antelmintiques, vulnérables, émollientes, sont nombreuses; on peut les diviser, les sécher, les réduire en poudre, et les conserver en cet état, pour les employer ensuite sous forme de sachet ou de cataplasme; mais à défaut d'une espèce, on prendra l'autre dans la même classe; il en est de même des feuilles et fleurs pectorales, des racines spiritives et astringentes; une seule d'entre elles remplacera toutes les autres.

SECTION II.

BOISSONS.

Tyane commune.

Prenez orge entière . . . 2 kilos (4liv.)

Après l'avoir lavé à l'eau chaude,

faites bouillir dans eau commune 32 kilos (64liv.)

Ajoutez vers la fin régime effilé 128 grammes (4 onces)

Passez à travers un tamis de crin.

La tisane ou la boisson ordinaire des malades, peut être remplacée par une décoction légère de chicendont, ou d'une autre substance végétale au gré des médecins. Il leur est cependant recommandé de ne prescrire, outre les boissons convenables, que celle qui est indispensable pour remplir une indication particulière. Aucune tisane ne sera élaborée: l'emploi du sucre et du miel est réservé aux boissons gommeuses, acides et aux potions.

Tisane de racine de patience.

Prenez racine de patience sèche. 128 grammes (4 onces)
Faites bouillir dans eau 7 litres
Jusqu'à réduction de 3 litres (10 liv.)
Ajoutez réglisse coupée 8 grammes (3 gros.)
Passez.

Tisane ou décoction de graine de lin.

Prenez graine de lin. 16 grammes ($\frac{1}{2}$ once.)
Faites bouillir pendant une demi-
heure dans eau 2 litres (2 pintes.)
Jusqu'à la réduction de 1 lit. $\frac{1}{2}$ (1 pint. $\frac{1}{2}$)
Ajoutez sur la fin réglisse coupée. 16 grammes ($\frac{1}{2}$ once.)
Passez.

Tisane sudorifique.

Prenez capsules sudorifiques . . . 50 grammes (1 once)
 Faites bouillir dans eau . . . 1 litre $\frac{1}{2}$ (3 liv.)
 jusqu'à réduction de . . . 1 litre (2 livres.)
 Mettez-y infuser ensuite capsules 4 grammes (1 gros).
 Pensez.

Tisane ou Eau de riz.

Prenez riz bien lavé . . . 16 grammes (1 once)
 Faites bouillir dans suffisante quantité d'eau, de manière que quand le grain sera crevé, il reste . . . 1 litre (2 livres.)
 Ajoutez vers le fin-de-cuira d'orange sèche . . . 4 grammes (1 gros)
 Après un quart-d'heure d'infusion, passez.

Tisane ou décoction blanche.

Prenez mie de pain . . . 64 grammes (2 onces)
 Corne de cerf calcinée au blanc et porphyrisée . . . 8 grammes (2 gros)
 Faites bouillir dans eau commune 1 litre (2 livres.)
 Passez à travers une étamine claire.
 Ajoutez à la colature sirop de gomme . . . 32 grammes (1 once)
 quelques gouttes de teinture alcoolique de caselle.

Cette boisson doit être administrée trouble afin que le malade puisse, chaque fois, prendre une certaine quantité de corne de cerf calcinée, qui en forme la partie essentielle, et sans laquelle elle ne produit que l'effet alimentaire;

Il faut donc se faire garde dans la calcination des corne de cerf ou autres os qui peuvent les remplacer, de la pousser trop loin, dans la crainte qu'ils ne passent à l'état vitriforme et ne perdent de leurs propriétés; il est donc nécessaire qu'ils conservent la friabilité de la corne.

Tisane anti-scorbutique.

Prenez infusion simple . . . 1 litre (2 livres.)
Teinture alcoolique de saffort 32 grammes (1 once.)

Pour diviser en quatre fois, et n'ajouter la teinture qu'au moment d'administrer la tisane.

Tisane apéritive.

Prenez espèces spiritives . . . 64 grammes (2 onces.)
Faites bouillir dans une calasse

quantité d'eau réduite par une
ébullition modérée à . . . 2 litres (2 pintes.)

Ajoutez à chaque dose la quantité d'acétate de potasse liquide (terre foliée de tartre) ou d'ammoniaque (esprit de mandragore), qui aura été prescrite.

Tisane fébrifuge ou décoction.

Prenez quinquina concassé . . . 50 grammes (2 onces.)

Faites bouillir dans eau . . . 5 litres (5 litres.)

que vous réduirez à . . . 5 litres (5 litres.)

Passez la décoction, à laquelle
on ajoutera les sels prescrits.

La dose sera de . . . 125 grammes (5 onces.)

deux à trois fois par jour.

Tisane purgative, dite Royale.

Prenez décoction bouillante

des feuilles de chicorée sau-

rage 1 litre (1 pinte.)

Laissez infuser pendant la
nuit,

Séné 24 grammes (5 grains.)

Tartre acide de potasse

(crème de tartre) . . . 12 décigrammes (24 grains.)

Sulfate de soude (sel de gla-

ce) 24 grammes (5 grains.)

Avis et cochenille, de chag. 2 grammes (4 grains.)

Passez le lendemain matin sans expression,
pour prendre en quatre fois.*Infusion de saussurea.*

Prenez saussurea coupé menu . . . 50 grammes (1 once.)

Versez dessus eau bouillante . . . 4 litres (8 litres.)

Faites infuser pendant quatre heures dans
un vase bien clos.La dose de 195 grammes (5 onces) plu-
sieurs fois dans le jour.

Infusion vulnéraire.

Prenez espèces vulnéraires . . . 18 grammes (3 gros.)
 Vases de verre ou bouillante . . . 2 litres (4 livres.)

Faites infuser pendant une heure dans un vaisseau clos, et passez la liqueur quand elle est refroidie.

On préparera de la même manière l'infusion de fleurs de sureau amère,
 pectorale.

Oxioros.

Prenez eau commune . . . 1 litre (2 livres.)
 Oximel simple 64 grammes (2 onces.)

Limonade avec l'acide du tartre.

Prenez sirop tartareux . . . 64 grammes (2 onces.)
 Eau commune 1 litre (2 livres.)
 Mêlez.

Limonade miladrée.

Prenez eau commune . . . 1 litre (2 livres.)
 Acide sulfurique à 65 degrés . . . 2 grammes (38 grains.)
 Sirop simple 64 grammes (2 onces.)
 Mêlez pour prendre par verrées.

N. B. Le pharmacien doit surveiller la préparation de cette boisson; exiger qu'elle soit tenue dans des vaisseaux de verre ou de ferroc, et non de terre vernissée, dont la couverture à presque toujours pour base un oxide de plomb très-soluble dans tous les acides. Il ne doit jamais permettre non plus qu'elle soit distribuée aux malades, qu'au préalable il ne l'ait goûtée, afin d'être assuré que l'acide a été pesé, et que

par conséquent il ne s'y trouve pas de mesure précise, la précaution devient sur-tout indispensable lorsque la dose d'acide est prescrite vaguement par gouttes *quod grarum aciditatem*. La pincée et la poignée sont infestées également à ces inconvénients. Nous en dirons autant des mesures de capacité; ce n'est évidemment que par la balance qu'on peut venir à bout de préciser, d'estimer la quantité des objets qui entrent dans une formule. Il faut tout peser en pharmacie, ne s'écarter, en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, de cette règle de prudence. Sans le secours de la balance, les médicaments les plus efficaces ne servent que de vrais poisons.

Emulsion.

Petites amandes douces pilées	8 grammes (2 gros.)
Eau	4 kilogr. (1 livre.)
Mettre les amandes d'abord dans un mortier de marbre, piler en ajoutant peu à peu de l'eau; délayer la pâte formée avec le reste de ce liquide; passer à travers une étamine, et ajouter sirop de sucre	16 grammes (1 once.)
Four prendre en trois parties égales.	

Ainsi préparée, l'émulsion se nomme simple. Elle est nitrée en y mêlant depuis trois décigrammes jusqu'à un gramme de nitrate de potasse (nitre) (3 à 13 grains); elle devient anodine lorsqu'on remplace le sirop de sucre par le sirop diacode à moitié de la dose; purgative enfin, quand on y délaye de la poudre cathartique.

Petit-lait.

On coagulera le lait avec le vinaigre ou avec le tartrate acide de potasse (crème de tartre), et on clarifiera le petit-lait avec le blanc d'œuf.

Cette boisson ne doit être prescrite que dans les cas absolument nécessaires, et lorsque les circonstances des temps et des lieux n'y apporteront pas d'obstacles.

Comme le lait de breues ne diffère du lait ordinaire qu'en ce qu'il est parfaitement crémé, toutes les fois qu'on pourra le tirer des crémiers ou des fabriques de beurre, on le prendra de préférence, parce qu'il coûte moins cher, et peut plus facilement subir la coagulation. Le serum qu'on obtient après la séparation de la matière caséuse ou fromage, n'étant absolument que le petit-lait, doit encore remplacer le lait pour la boisson dont il s'agit, soit dans l'état où il se trouve, ou bien après l'avoir clarifié.

Bière sapinette.

Prenez bourgeons de sapin, et à leur défaut,

Feuilles du même arbre . . . 32 grammes (1 once)

Racine de saffort sauvage incisée 16 grammes ($\frac{1}{2}$ once.)

⚗️ Faites macérer pendant trois jours

dans un vase bien clos, avec

bonne bière 2 litres ($\frac{1}{2}$ liv.)

La dose sera de 2 onces, deux fois par jour.

Eau gomme.

Prenez gomme arabique concassée 32 gr^{mes} (1 once.)
 Sirop de sucre 64 gr^{mes} (2 onc.)
 Dissolvez dans l'eau commune . . . 2 litres (4 livre.)

Eau de Tamarins.

Prenez tamarins 64 gr^{mes} (2 onces.)
 Délayez dans un vase de faïence
 ou d'étain, en versant dessus
 peu à peu eau bouillante . . . 1 litre (2 livres.)
 Miel blanc 32 gr^{mes} (1 once.)
 Passez à travers un linge.

Eau fondante purgative.

Prenez sulfate de soude (sel de
 glauber) 32 gr^{mes} (1 once.)
 Tartrate antimonié de potasse
 (émétique) 3 centes (½ grain.)
 Nitrate de potasse (nitre) . . . 6 drag. (12 gr.)
 Faites fondre le tout dans eau . . . 1 litre (2 livres.)
 à prendre par verres à distance convenable.

Eau de goudron.

Prenez goudron 16 gr^{mes} (½ once.)
 Versé dans eau commune . . . 1 litre (2 livres.)

Agitez souvent pendant trois jours; passez la
 liqueur, et conservez-la pour l'usage.

La dose est de 193 grammes (6 onces), une ou
 deux fois par jour; cette eau peut être coupée avec
 le lait.

Eau de fer et de manganèse.

Prenez boules de mars, environ 6 à 7 décigrammes,
 (10 à 12 grains.)
 Triturez l'espace de temps néces-
 saire avec eau tiède . . . 4 litres (1 livre.)
 Filtrer ou laissez reposer, puis décantez.

Cette eau se divise en trois doses, à prendre
 de demi-heure en demi-heure.

Eau anti-syphilitique (liqueur Van-Swieten).

Prenez muriate sur-oxygéné de
 Mercure (sublimé corrosif) 4 décigrammes (8 gr.)
 Eau distillée 4 litres (1 livre.)

La dissolution se fait toujours dans des vais-
 seaux de verre ou de faïence, et sera adminis-
 trée aux malades dans des gobelets de même
 nature.

Le véhicule dans lequel cette solution devra
 être administrée, sera d'un demi-kilogramme
 (une livre) de décoction légère de racine de
 guaiacum, ou une dissolution de quatre gram-
 mes (un gros) de gomme arabique dans un
 demi-kilogramme (une livre d'eau), en obser-
 vant que le mélange n'ait lieu qu'au moment de
 la faire prendre.

On doit préférer l'eau gommée au lait et à
 tout autres excipients; il est reconnu que la
 gomme est de toutes les substances, celle qui

alère le moins le mariato sub-
cure (sublime cures).

SECTION III.

VINS MÉDICINAUX.

Vin amer ou stomachique.

Prenez teinture de gentiane . . . 24 grammes (6 gros.)

Vin rouge ou blanc . . . 1 litre (2 livres.)

Mélez.

Dose commune . . . 32 grammes (1 once.)

Vin anticholérique ou d'absinthe.

Prenez vin rouge ou blanc . . . 1 litre (2 livres.)

Teinture d'absinthe, depuis . . . 24 grammes (2 gros.)

jusqu'à . . . 48 grammes (4 gros.)

Mélez.

Dose commune . . . 32 grammes (1 once.)

Vin fébrifuge ou de quinquina.

Prenez vin rouge ou blanc . . . 1 litre (2 livres.)

Teinture de quinquina depuis . . . 48 grammes (1 once. 1/2.)

jusqu'à . . . 80 grammes (2 once. 1/2.)

Mélez.

Dose commune . . . 60 grammes (2 once.)

Vin anti-scorbutique.

Prenez vin rouge ou blanc . . . 1 litre (2 livres.)

Teinture de raifort, depuis . . . 32 grammes (1 once.)

jusqu'à . . . 48 grammes (1 once. 1/2.)

Mélez.

Dose commune . . . 32 grammes (1 once.)

Pâte cordiale.

Prenez Vin rouge ou blanc . . . 1 kil^{gr} (2 livres.)
 Teinture alcoolique de canelle,
 Dépôt 24 grammes (6 grains.)
 Jusq'à 48 grammes (1 once.)
 Mêlez.
 Dose commune : 50 grammes (1 once.)

Pâte châtée ou marcial.

Prenez teinture de manistartaria 50 grammes (1 once.)
 Vin rouge ou blanc 1 litre (2 pints.)
 Mêlez et filtrez.

Pâte scillitique.

Prenez squamées de scille séchées
 et coupées menues 64 grammes (2 onces.)
 Mettez-les dans un matras; versez
 dessus vin blanc 1 kil^{gr} (2 livr.)
 Faites macérer pendant trois à qua-
 tre jours en été, et plus long-
 temps en hiver.
 Passez à travers un linge.
 Ajoutez alcool à 55 degrés . . . 64 grammes (2 onces.)

Filtrez la liqueur et conservez-la pour l'usage
 dans des petites bouteilles bien fermées.

On en prescrira la dose.

Pâte miellée

Prenez Miel blanc 96 grammes (3 onces.)
 Vin rouge 1 kil^{gr} (1 livre.)
 Mêlez.

FORMULAIRE SECTION IV POTIONS.

Potion purgative ordinaire.

Prenez séné ^{1/2} 5 grammes (2 gros.)
Sulfate de soude (sel de glauber) 15 grammes (3 gros.)
Faites bouillir légèrement dans une
contenance 150 grammes (5 onces.)
Ajoutez sirop de sucre . . . 32 grammes (1 once.)
pour une dose.

Potion purgative majeure.

Ajoutez à la potion purgative,
Poudre cathartique depuis 15 décigrammes (24 grains.)
jusqu'à 18 décigrammes (36 grains.)

Potion purgative avec la manne.

Prenez la potion purgative ordinaire, substituez
au sirop,
Manne grasse 64 grammes (2 onces.)

Potion purgative avec la rhubarbe.

Prenez rhubarbe concassée . . 4 grammes (1 gros.)
Faites bouillir légèrement dans
suffisante quantité d'eau ré-
duite à 150 grammes (4 onces.)
Dissolvez manne 64 grammes (2 onces.)

Potion

Potion vomitive avec l'émétique.

Prenez tartre antimonial de potasse (émétique)
 15 centes (3 grains.)
 Dissolvez dans eau de rivière
 chauffée 350 grammes (12 onces.)

Divisez en trois parties égales à prendre de
 quart-d'heure en quart-d'heure avec les précau-
 tions connues.

Potion vomitive avec l'ipécacuanha.

Prenez ipécacuanha en poudre 1 gram (18 grains.)
 Délayez dans eau commune 150 grammes (4 onces.)
 Pour une dose.

Lorsqu'on veut en augmenter l'effet on y ajou-
 te tartre antimonial de potasse (émétique) depuis
 3 centigrammes ($\frac{1}{2}$ grain) jusqu'à 12 (2 grains).

Potion cordiale.

Prenez vin cordial 150 grammes (4 onces.)
 Alcool à la menthe, une cuiller
 à café.
 Sirop de sucre 50 grammes (1 once.)
 Mélangez pour une potion à prendre par cuillerée.

Potion de Rivière.

Prenez carbonate de potasse
 (alkali végétal) 12 décigrammes (1 scrup.)
 Mélangez dans eau commune 95 grammes (3 onces.)
 Sirop tartareux 50 grammes (1 once.)

■ ■

Ce mélange se fera au chef de la pharmacie, qui prendra le potion au moment où le gaz acide carbonique se dégage.

L'effervescence est plus tardive avec le sirop tartareux qu'avec le suc de limon ou le vinaigre blanc; mais l'effet de la potion s'en est que plus certain.

Potion fébrifuge.

Prenez vin fébrifuge . . . 128 grammes (4 onces.)

Muriate d'ammoniaque (sel ammoniac) . . . 5 décigrammes (6 grains.)

Mélez pour une dose à prendre sur-le-champ. Cette potion peut être répétée deux à trois fois par jour.

Potion avec le quinquina.

Prenez quinquina en poudre 8 grammes (2 gros.)

Muriate d'ammoniaque . 5 décigrammes (6 grains.)

Vin rouge ou blanc . . . 128 grammes (4 onces.)

Mélez pour une dose à prendre sur-le-champ. Cette potion peut être répétée deux et trois fois par jour.

Potion anti-spasmodique.

Prenez infus. de fleurs de tilleul 128 grammes (4 onces.)

Sirop de sucre . . . 5 grammes (1 once.)

Ether sulfurique alcoolisé . 2 grammes (4 grains.)

Vin d'opéra composé . . . 2 grammes (4 grains.)

Mélez pour prendre par cuillerée.

Potion anti-septique.

Prenez décoction de quinquina 128 grammes (4 onces.)

Tincture alcoolique de camille 8 grammes (2 gros.)

Acétate d'ammoniaque (esprit de mindérerus) . . . 3 grammes (2 gros.)

Sirop de sucre . . . 5 grammes (1 once.)

Mélez.

Potion anti-septique composée.

À la potion précédente, ajoutez camphre divisé dans un peu de jus de citron; de 1 à 7 décigrammes (Grains.)

Potion à prendre avec le kermès.

Prenez gomme adragant . . . 5 décigrammes (10 grains.)
 Kermès minéral . . . 1 décigramme $\frac{1}{2}$ (3 grains.)
 Tannez le mélange, et
 ajoutez-y peu à peu si-
 rop de gomme . . . 32 grammes (1 once.)
 Tisane ordinaire . . . 128 grammes (4 onces.)
 Pour une potion à prendre par cuillerée.

Potion pectorale.

Prenez infusion pectorale 128 grammes (4 onces.)
 Gomme arabique en pou-
 dre . . . 12 décigrammes (24 grains.)
 Sirop de guimauve . . . 32 grammes (1 once.)
 Mêlez à prendre par cuillerée.

Potion mucilagineuse.

Prenez tisane commune . . . 128 grammes (4 onces.)
 Sirop-diacode de 16 à 32 grammes . (de 4 once à 1 on-
 ce.)

Mêlez: pour deux doses, qu'on administre à
 une heure d'intervalle.

Potion acidulée.

Prenez tisane commune 128 grammes (4 onces.)
 Sirop tartareux . . . 16 grammes ($\frac{1}{2}$ once.)
 Alcool citrique (extrait de
 sucre dulcifié) . . . 7 décigrammes (15 gout.)

Mêlez: pour trois doses à prendre à une heu-
 re d'intervalle.

Potion d'arrêter

Prenez acétate d'ammoniaque liquide (esprit de minéralisés) 64 grammes (2 onces.)
 Teinture alcoolique de raifort 32 grammes (1 once.)
 Tisane apéritive 64 grammes (2 onces.)

Mêlez pour prendre par cuillerées en vingt-quatre heures, dans un liquide approprié.

SECTION V.

SUCS D'HERBES.

Les plantes qu'on est dans l'usage de presser, sous la forme de suc exprimé, dans la saison où il est possible de les avoir facilement, et pourvus de toute leur vigueur, sont :

La bourse-loup,	La déperdition de leurs suc doit toujours s'opérer à la chaleur du bain-marie, tem- pérature que ces plantes peu- vent supporter sans courir les risques de perdre de leur vertu.
La buglose,	
La chicorée sauvage,	
Le pissenlit,	
La laitue,	
Le trèfle d'eau,	

Le creuson de fontaine,	La déperdition de ces plantes se fait toujours à froid, au moyen du filtre de papier. La plus légère cha- leur dissiperait une partie de l'o- deur nécessaire pour l'altération qu'elles contiennent, et troublerait leur transpa- rence.
L'oseille,	
Le cochléar.	
Le bœuf-lait,	
Le fennec,	
Le cerfeuil.	

Les sucres crus sera depuis 64 grammes (2 onces), jusqu'à 128 grammes (6 onces), une ou deux fois par jour. Comme médicament magistral, ils doivent être préparés tous les jours.

Ces sucres ne jouissent plus en automne de leurs propriétés spécifiques; à cette époque, d'ailleurs, on ne peut se les procurer fraîches, qu'avec beaucoup de peines et de dépenses; on remplacera les sucres qu'on en extrait par leur extrait délayé dans un véhicule approprié, à la dose d'un demi-gros par once de vin.

À l'égard des plantes dites anti-scorbutiques, comme elles contiennent un principe volatil, on substituera à leurs sucres l'infusion simple, à laquelle on ajoutera une ou deux cuillerées à café de teinture alcoolique de raifort; ainsi, depuis vendémiaire jusqu'au mois de germinal, la préparation des sucres d'herbes devra être interdite dans les pharmacies militaires.

SECTION VI.

DES POUDRES.

Poudre de réglisse.

Prenez réglisse mondée et lavée; couper-la par tranches extrêmement minces, et faire la sé-

cher, en prenant la précaution de le mouler souvent: peu de temps après l'avoir retiré de l'éthuve, pilez-le dans un mortier de fer, et passez la poudre à travers un tamis de soie très-fin. Lorsqu'il ne restera plus que des débris fibreux, cessez la pulvérisation, et renfermez la poudre obtenue dans un vaisseau bien bouché.

Ce mode est applicable à toutes les racines, écorces et feuilles dont le tissu est fibreux, tandis qu'il faut pour les racines et les écorces résineuses, telles que le quinquina et le jalap, il faut pousser jusqu'à la fin de la pulvérisation et éviter de laisser un résidu. Mais, compte les propriétés de l'opéocumbe résident entièrement à l'extérieur de ces racines, il faut séparer l'écorce du cœur ligaturé quelle enveloppe, pour ne brayer ou pulvériser qu'elle.

À l'égard de la scille, on parvient à dépouiller cette bulbe de toute son humidité recabondante, en divisant les squames par lamelles avant de la mettre en poudre.

Poudre cathartique.

Prenez poudre de jalap	50 grammes (2 onces)
De tartre acide de potasse (seléne de tartre)	44 grammes (2 onces)
De scammonée	32 grammes (1 once)

pendant quelques minutes les trois substances, pour en former un mélange exact et homogène.

La dose sera d'un gramme (18 grains) à 5 grammes (54 grains), sous forme de bol ou dans un liquide approprié.

Poudre antihelmintique.

Prenez carduus de Corse mondée	} de chaque
Semen contra	

Avant de confier ces deux substances au mortier, on les portera à l'ébullition; et après leur dessiccation, on les mêlera et on les réduira en poudre.

La dose sera de deux grammes (demi-grain) à 4 grammes (2 grains), sous forme de bol ou dans un véhicule approprié.

Poudre tempérante.

Prenez nitrate de potasse en poudre	
(nitre)	30 grammes (1 once.)
Campfire divisé par l'alcool	5 grammes (2 grains.)
Tribolons et mûles.	

La dose est de 5 décigrammes (6 grains), plusieurs fois dans le jour, sous forme de bol ou dans un véhicule approprié.

Poudre absorbante.

Prenez magnésie calcinée ou pure 35 grammes (3 onces.)
 Nitrate de potasse purifiée (nitre) 8 grammes (2 grains.)
 Sucre en poudre fine . . . 15 grammes (4 grains.)

Triturez et mêlez. La dose est de 2 grammes (un demi-grain), plusieurs fois dans le jour.

SECTION VII

B O L S.

Bol purgatif.

Prenez jalap en poudre . . 24 décimes (48 grains.)
 Crème de tartre . . . 8 décimes (16 grains.)

Mêlez avec suffisante quantité de miel pour prendre sous forme de bol.

Bol stomachique.

Prenez safran en poudre . . 3 décimes (6 grains.)
 Cardelle en poudre . . . 1 décime $\frac{1}{2}$ (3 grains.)
 Magnésie pure . . . 4 décimes (8 grains.)
 Sirop de sucre . . . quantité suffisante.

Mêlez et faites un bol ou un électuaire, qui peut suppléer avec avantage la confection d'hyacinthe.

Bol antihelminthique.

Prenez poudre antihelminthique 24 décim. (48 gr.)
 Muriate de mercure sous por-
 phyrisé 2 décim. (4 gr.)
 Miel quantité suffi-
 sante.

Divisez en bols pour une seule dose.

Bol astringent.

Prenez cachou en poudre 6 décim. (12 gr.)
 Conserve de roses quantité suffi-
 sante pour former un bol.

Bol calmant.

Prenez extrait aqueux d'opium 4 décim. (1 grain.)
 Poudre de réglisse 6 décim. (12 gr.)
 Conserve de roses quantité suffisante.

Faites un bol, qu'on répètera trois ou qua-
 tre fois par jour.

Bol de térébenthine.

Prenez térébenthine de Venise 6 décim. (12 gr.)
 Poudre de réglisse quantité suffi-
 sante.

Faites un bol, qu'on répètera deux ou trois
 fois le jour.

Bol antiscorbut.

Prenez antiscorbut porphyrisé 4 gramm. (1 grain.)
 Cannelle en poudre 1 gramm. (16 gr.)

Après avoir mêlé l'un et l'autre, ajoutez au

mélange une suffisante quantité de poudre de roses, pour former dix-huit bols. On en donnera un, deux, trois ou quatre par jour.

SECTION VIII.

PILULES.

Pilules scillitiques.

Fraux seves officinal . . .	16 gram (4 once.)	} de chaque 8 gram (2 gros.)
Gomme arabique . . .		
Nitrate de potasse (nitre) . .		
Scille en poudre . . .		

Faites avec le sirop de miel, des pilules de 2 décigramme à 2 (3 à 4 grains).

Pilules savonneuses.

Fraux seves officinal . . .	128 gram (4 once.)
Poudre de guimauve ou de ré-	
gline	10 gram (2 gros.)

Méles et pilez dans un mortier de marbre, avec suffisante quantité d'huile d'olive, pour en former des pilules de 2 décigram. (5 grains), dont la dose sera depuis une jusqu'à quatre par jour.

Pilules mercurielles.

Pierre de mercure crud	} de chaque 128 grammes (4 onces.)
Poudre de jalap . . .	
De scammonée . . .	
De tartre acidule de potasse (crème de tartre) . . .	64 grammes (2 onces.)
Sirup de carrouba . . .	128 grammes (4 onces.)

Il faut éteindre le mercure avec le tartre acidule de potasse et un peu de sirop; ajouter ensuite les poudres, et former du tout une masse pilulaire, qui doit être battue long-temps.

Dose depuis 12 décigrammes (24 grains) jusqu'à 48 décigrammes (96 grains).

Diviser la masse en pilules de 5 décigrammes (6 grains).

DEUXIÈME PARTIE.

Médicaments pour l'usage externe.

SECTION PREMIÈRE.

CATAPLASMES.

Cataplasme émollient.

Prenez farines de lin . . } de chaque parties
 d'orge . . } égales.

Délayez le mélange dans quantité suffisante d'eau, et faites cuire jusqu'à consistance requise.

Ce cataplasme peut être remplacé par des feuilles de mauve récente, qu'on fait cuire dans l'eau, et auxquelles on ajoute un peu de farine, pour donner de la consistance : lorsque la saison ne permet plus d'avoir de la mauve fraîche, on y substituera la poudre des espèces émollientes.

Cataplasme anodin.

Au lieu de se servir d'eau pour l'excipient du cataplasme émollient, on prendra une forte décoction de feuilles de perot noir et de jusquiame, dans laquelle on fera cuire les farines.

Cataplasme résolvant.

Au cataplasme précédent, ajoutez par litre (livre)
 Acétate de plomb liquide (extrait
 de saturne) 3 grammes (2 grains)

Cataplasme contre la gangrène.

Prenez farine d'orge 256 grammes (8 onces.)
 Faites cuire dans suffisante quantité d'eau.
 Ajoutez au cataplasme,
 Ten en écorce de chêne en poudre 64 grammes (2 onces.)
 Camphre réduit en poudre 4 grammes (1 grain.)

Lorsqu'on n'a point ces ingrédients sous la main, on peut en un moment obtenir un cataplasme anti-septique, en employant tout simplement du levain un peu avancé de froment, ou de seigle, ou d'orge, suivant les ressources locales.

Cataplasme suppuratif.

Ajoutez à un kilogramme (2 livres) de cataplasme émollient, pulpe d'oignon et onguent basilicum, de chaque 50 grammes (1 once.)

Cataplasme tonique.

Prenez farine d'orge 1 kilogr. (2 livres.)
 Esèce aromatique en poudre 64 grammes (2 onces.)
 Muriate d'ammoniaque (sel ammoniac) 8 grammes (2 grains.)

Faites cuire jusqu'à consistance requise avec suffisante quantité d'eau.

Sinapisme.

Prenez graine de moutarde en

peudre		32 grammes (1 once.)
Lavée		64 grammes (2 onces.)
Fort vinaigre		quantité suffisante.

Mêles en agitant.

Vésicatoire extemporané.

Prenez lervin ramolli avec un peu de vinaigre, quantité suffisante.

Etendez sur un linge et saupoudrez-en la surface avec des cantharides pulvérisées.

Usage du rhumeloen ou garou en vésicatoire.

On choisit des tiges de la grosseur d'une plume à écrire et qui ont l'écorce bien lisse; on en coupe un morceau d'environ six lignes de long; on le fait tremper dans l'eau tiède ou dans du vinaigre pendant une demi-heure, afin de ramollir l'écorce, on la fend avec un couteau, on sépare le bois qu'elle recouvre, il est prêt comme inutile; on applique la surface interne de l'écorce ainsi séparée, sur la partie où l'on veut produire un vésicatoire, après l'avoir frottée avec un peu de

vinaigre, on boit de vingt-quatre heures elle a fait son effet.

SECTION II.

GARGARISMES.

Gargarisme adoucissant.

Prenez décoction de racine de

guaiacum	255 grammes (8 onces.)
Miel de pommé	32 grammes (1 once.)
Millec.	

Gargarisme détersif.

Prenez feuilles d'ail	} de chaque 8 grammes (2 gros.)
grapevins	
De rose	

Faites bouillir légèrement dans

eau commune	255 grammes (8 onces.)
Passes et ajoutez à la colature,	
vin rosé	48 grammes (8 once.)
Acide sulfurique	1 gramme (16 grains.)

Gargarisme anti-pneumonique.

Au gargarisme adoucissant, ajoutez liqueur de Vau-

Swieten 8 à 16 grammes (2 à 4 gros.)

On aura grand soin de prévenir le malade de ne pas avaler ce gargarisme.

Gargarisme astrigent.

Prenez écorce de chêne	30 grammes (1 once.)
Eau de rivière	½ litre (1 livre)
Sulfate acide d'alumine (alun)	4 grammes (1 gros.)
Faites bouillir pendant quelques minutes, et ajoutez,	
Miel rosat	30 grammes (1 once.)

Gargarisme anti-scorbutique.

Prenez infusion aigre	250 grammes (8 onces.)
Tincture alcoolique de raifort	16 grammes (½ once)
Miel rosat	30 grammes (1 once)

Gargarisme anti-septique.

Prenez écorce de chêne	30 grammes (1 once.)
Faites bouillir dans suffisante quantité d'eau, jusqu'à réduction de	250 grammes (8 onces.)
Ajoutez oxygène simple	30 grammes (1 once.)
Mélang. - Ajoutez selon les circonstances et les prescriptions, alcool, ou camphre.	
Mariste d'ammoniaque (sel ammoniac)	6 décigrammes (12 grains.)

SECTION

SECTION III.

COLLYRES.

Collyre détensif.

Prenez sulfate de zinc (vitriol

blanc) 12 dégr^m (24 grains.)

Faites dissoudre dans infu-

sion de fleurs deureau 128 gr^m (6 onces.)

En ajoutant à ce collyre, teinture de myrthe et d'abord six gouttes, teinture alcoolique vulnérinaire une cuiller à café, ce sera le collyre détensif composé.

Collyre résolutif.

Prenez infusion de fleurs de

ureau 128 gr^m (4 onces.)

Acétate de plomb cristallisé

(sel de saturne) 6 gouttes (6 grains.)

Teinture alcoolique vulnérinaire

(eau vulnérinaire) 8 gr^m (2 gros.)

On s'abstient d'ajouter ici un plus grand nombre de collyres; le besoin et les circonstances détermineront mieux la prescription des autres.

SECTION IV.

LOTIONS ET FOMENTATIONS.

Eau anti-porrique.

Prenez feuilles de tabac séchées, 1 kil^m (2 liv.)

Faites bouillir légèrement dans

eau commune 7 kil^m $\frac{1}{2}$ (15 liv.)

Ajoutez à la fin, carbonate de

soude (alkali minéral) . . . 128 gr^m $\frac{1}{2}$ (4 onc.)

Passez et conservez pour l'usage.

La dose est de 128 grammes (4 onces) pour chaque friction, qui peut être répétée deux fois par jour.

On pourroit substituer avantageusement à cette eau la première lessive des salpêtres, la solution dans l'eau de quelques matières salines, comme le sel ammoniac, le sel de cuisine, il seroit même utile de préférer ces lotions à l'onguent de soufre, parce qu'il gâte beaucoup de linge, donne aux fournitures un aspect hideux, et entretient dans les salles où on traite les galeux, une odeur détestable; mais il faut s'abstenir dans l'usage des lotions de ce genre, d'en faire l'application sur toute la région abdominale.

Eau végitale-minérale.

Prenez eau de rivière 1 kil^m (2 livr.)

Acétate de plomb liquide (extrait

de saturne) depuis 8 gr^m (2 gros)

jusqu'à 26 gr^m (4 gros)

Mélez en agitant.

Vin aromatique.

Prenez espèces aromatiques . . 64 gr^m (2 onces)

Vin rouge haut en couleur . . . 1 kil^m (2 livr.)

Mettez en digestion pendant douze heures; passez avec expression et préparez ce vin à mesure du besoin, autrement il tourneroit promptement à l'acide, et ne rempliroit pas l'indication.

Fomentation résolutive.

Prenez infusion aromatique . . 1 kil^m (2 livres.)

Miel rosé 64 gr^m (2 onces.)

On peut ajouter au besoin,

Alcool au camphre, depuis . . . 8 gr^m (2 gros.)

jusqu'à 32 gr^m (1 once.)

Fomentation tannique.

Prenez écorce de chêne 48 gr^m (1 once $\frac{1}{2}$.)

Eau de rivière 1 kil^m (2 livres.)

Faites bouillir jusqu'à la réduction de $\frac{1}{2}$ kilogr.

(1 livre); ajoutez à la colature,

Sulfate d'alumine (alun) 12 gr^m (3 gros.)

SECTION V.

LINIMENS.

Liniment anodin.

Prenez huile d'olive 32 gr^m (1 once.)

Vin d'opium composé depuis 2 gr^m ($\frac{1}{2}$ gros.)

 jusqu'à 4 gr^m (1 gros.)

Mélez en agitant.

Liniment ammoniacal.

Prenez huile d'olive 32 gr^m (1 once.)

Ammoniaque 6 gr^m (1 gros $\frac{1}{2}$.)

Agitez dans une bouteille fermée, jusqu'à ce que ces substances soient bien mêlées.

Liniment camphré.

Prenez camphre 8 gr^m (2 gros.)

Huile d'olive 54 gr^m (2 once.)

Triturez et mêlez.

Lavement souverain.

Prenez huile d'olive 2 gr^m ($\frac{1}{2}$ gros)

Teinture alcoolique vulnéraire

vulnéraire) 32 gr^m (1 once)

Savon officinal 8 gr^m (2 gros)

Faites dissoudre le savon dans la teinture vulnéraire, et mêlez le tout en triturant.

SECTION VI.

INJECTIONS ET LAVEMENTS.

Injection émolliente.

Prenez espèces émollientes . . 32 gr^m (1 once)

Faites bouillir dans eau com-

mune 128 gr^m (4 onces)

Passer.

Injection anti-septique.

Infusion amère

Décoction d'écorce de } de chaq. $\frac{1}{2}$ kil^m (1 liv.)

chêne

Admex, suivant l'indication, avec

alcool camphré . . . 32 à 64 gr^m (1 à 2 onc.)

Lavement ordinaire.

Prenez espèces émollientes, 16 grammes (demi-once), faites bouillir dans suffisante quantité d'eau.

Passer.

Lavement adoucissant.

Prenez décoction de graine de lin, quantité suffisante, ajoutez à la colature huile d'olive; 16 grammes (demi-once).

Lavement astringent.

Prenez espèces astringentes 30 gr^m (1 once.)

Têtes de pavots 12 gr^m (3 gros.)

Faites une forte décoction avec 1 kilogramme (2 livres) d'eau réduite en demi-kilogramme (1 livre).

Lavement laxatif.

Prenez infusion de graine de lin quantité suffisante.

Séné 16 gr^m (½ onc.)

Sulfate de soude (sel de glauber) 8 gr^m (2 gros.)

Faites bouillir légèrement, et passez avec expression, pour un lavement.

Lavement de tabac.

Prenez feuilles de tabac séchées 30 gr^m (1 once.)

Faites bouillir légèrement dans

eau commune 4 kil^m (1 livre.)

Ajoutez à la colature,

Tartrate antimonié de potasse

(émétique), depuis . . . 3 décig^m (6 grains)

jusqu'à 6 décig^m (12 grains)

Lavement purgatif.

Prenez stéar 16 gr^m (1 once.)
 Sulfate de magnésie (sel d'épsein) 16 gr^m (1 once.)
 Faites bouillir au moment eau 4 kil^m (1 livre.)
 Ajoutez tertrite antimonié de po-
 tasse (émétique) . . . 2 déc^m (4 grains.)

F O R M U L E S.

*De quelques médicamens officinaux inter-
 nes et externes, dont la plupart ne sont
 point décrits dans le Codex de la ci-de-
 vant Faculté de médecine de Paris, et
 qui, indépendamment des prescriptions
 magistrales, peuvent, au besoin, être
 préparées dans les établissemens civils
 et militaires.*

*Acétate de potasse liquide (terre solée de
 tartre.)*

Prenez carbonate de potasse purifiée, la quan-
 tité que vous voudrez; versez par-dessus peu
 à peu du fort vinaigre blanc jusqu'au point de
 saturation. Filtrer et conserver pour l'usage.

La liqueur résultant de ce mélange contient par 32 grammes (1 once) environ 15 déci-gram. (30 grains) de terre foliée de terre sèche. Le mode indiqué ici appartient à Boerhaave; il est prompt, commode, économique, et donne un médicament très efficace.

Acétate de soude liquide (terre foliée minérale).

Si au lieu de carbonate de potasse (alkali végétal) c'est celui de soude (alkali minéral) qu'on emploie, on obtiendra l'acétate de soude liquide; évaporé jusqu'à consistance de sirop épais, et mis dans un endroit tempéré, cet acétate formera des cristaux en prismes aiguillés, qui pourroient entrer assés dans des opiates ou des pilules; 32 grammes (1 once) d'acétate de soude liquide, égalent 8 grammes (2 gros) d'acétate de soude solide.

Acétate ammoniacal liquide (esprit de mindérerus).

Verser sur le carbonate d'ammoniaque concret (alkali volatil) du vinaigre blanc, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effervescence; filtrer la liqueur, conserver pour l'usage.

Les acétats dont il s'agit ont été employés pendant la dernière guerre dans les hôpitaux

militaires avec le plus grand succès. Gardés dans l'état liquide, ils n'ont aucun des inconvéniens des acétates desséchés; ceux-ci pour prendre cette forme sont pendant leur évaporation, trop long-temps en contact avec l'air et la lumière pour ne pas éprouver dans leur combinaison des changemens notables. Tous doivent donc mériter la préférence, à raison de la facile décomposition qu'ils subissent à l'évaporation la plus ménagée, des soins, des embarras et des frais qu'ils exigent pour les obtenir concres; mais il faut avoir l'attention de n'en préparer qu'à mesure du besoin, parce qu'ils pourroient, à la longue, se désorierer.

Acétate de plomb liquide (extrait de saturne.)

Prenez oxide de plomb demi

pitreux en poudre 4 lb℥ (1 liv.)

Vinaigre blanc 2 lb℥ (4 liv.)

Faites bouillir légèrement dans un vase de terre vernissée, en agitant continuellement avec une spatule de bois jusqu'à la réduction de moitié; Filtez ensuite la liqueur quand elle est refroidie; conservez-la dans un vaisseau bien bouché.

Le résidu qui demeure au fond est l'oxide de plomb non épuisé, dont on peut encore tirer parti en le faisant servir avec du nouveau vinaigre, pour en former un nouvel extrait de

saturé, ainsi que cela se pratique dans quelques hôpitaux militaires.

Si au lieu de vinaigre ordinaire on emploie celui qui a été distillé, et qu'on laisse évaporer la liqueur, on obtient, par le refroidissement possible, des cristaux en prismes allongés ou en aiguilles informes, c'est l'acétate de plomb cristallisé (sucre ou sel de saturne), qui se prépare en grand aujourd'hui dans plusieurs de nos départements, par un procédé beaucoup plus économique que celui dont se servoient les Bataves.

Acide tartareux.

On le prépare de la manière suivante :

Prenez tartre acide de potasse

(cette de tartre) 3 kil^m (5 livres.)

Carbonate calcaire pulvérisé

(chaux) quantité suffisante.

Eau de rivière 12 kil^m (24 livr.)

Faites bouillir dans une marmite de terre, l'eau avec le tartre acide.

Projetez-y peu à peu le carbonate calcaire, en agitant avec une spatule de bois, et jusqu'à ce que la cessation de l'effervescence indique l'absorption totale de l'acide.

Le tartre de chaux résultant de cette combinaison, est insoluble; il se précipite; on le sépare par décantation; on le lave à l'eau froi-

de; on le mêle par portion avec de l'acide sulfurique préparé dans les proportions de 6 kilogrammes (12 liv.) d'eau, sur 640 grammes (7 onces) d'acide concentré.

Le tartre de chaux se décompose; il se forme du sulfate de chaux (sélénite) qui est insoluble.

L'acide tartareux reste dans la liqueur sur-nageante s'y cristallise après une évaporation, pendant laquelle il se précipite encore du sulfate de chaux qu'on a soin d'en séparer.

On le purifie en dissolvant les cristaux à froid dans l'eau, en procédant à une nouvelle cristallisation.

En prenant la liqueur qui contient l'acide tartareux, après qu'elle est débarrassée du sulfate de chaux, et avant qu'elle pût donner des cristaux, on auroit un acide tartareux fluide, dont l'emploi pourroit être facilement déterminé.

Carbonate de magnésie.

Faites dissoudre dans une grande quantité d'eau du sulfate de magnésie (sel de sulfate, sel d'epsom d'Angleterre). Filtré la dissolution, versez du carbonate de potasse liquide et qui ne soit pas saturé, jusqu'à ce que la décomposition du sulfate soit complète; ce dont il sera facile de s'assurer, lorsqu'il ne se précipitera plus de flocons blancs, par l'affusion

de la potasse. Filtrer ensuite, et vous obtiendrez sur le filtre du carbonate de magnésium, qu'il faudra laver à plusieurs eaux chaudes pour enlever le sulfate de potasse (tartre vitriolé) et sécher avec soin.

Magnésie pure.

Prenex carbonate de magnésium, calcinez-le dans un creuset que vous entretiendrez rouge pendant deux heures; l'acide carbonique se dégagera de la magnésie; elle sera alors pure, non effervescente, très blanche, très-légère; mais il faut savoir l'attention de la tenir dans un flacon bien bouché, sans quoi elle se tartarderait point à reprendre l'acide carbonique dont elle avoit été privée par la calcination.

Eau de chaux.

Prenex chaux vive . . . : 4 kil^m (8 livres.)

Mettez-la dans une terrine et arrosez-la avec une petite quantité d'eau, afin de la faire fuser.

Lorsque la chaux sera éteinte et réduite en poudre, ajoutez-y

Eau commune 4 kil^m (8 livres.)

Agitez le tout avec une spatule de bois, et introduisez la liqueur trouble dans une bouteille de verre ou de grès, que l'on bouchera avec soin. La chaux gagnera bientôt le fond du vase, et la liqueur ne tardera pas à s'éclaircir.

Toutes les fois, que l'on aura besoin d'eau de chaux, on en décantera la quantité prescrite, et l'on ajoutera à l'instant la même quantité d'eau commune; on agitera de nouveau, et on laissera déposer, comme il est dit ci-dessus. C'est le moyen d'avoir toujours sous la main de bonne eau de chaux.

Éponges préparées.

Choisissez des éponges fines; lavez-les assez exactement pour qu'il n'y existe plus de corps étrangers, tandis qu'elles sont mouillées, entourez-les de ficelle en les serrant fortement; faites en sorte que les tours de la ficelle se touchent d'une manière si exacte, que toute l'éponge se trouve recouverte (à peu près comme les carottes de tabac); ayez soin surtout, que la ficelle soit arrêtée à chaque bout de l'éponge par un nœud qu'on puisse défaire à volonté.

La partie de l'éponge découverte, peut être ensuite divisée à l'aide d'un instrument tranchant, et recevoir toutes les formes qu'on veut lui donner.

Les éponges préparées suivant ce procédé, doivent toujours être conservées dans des endroits à l'abri de l'humidité; leur usage est incomparablement supérieur à celui des épon-

ges cirées. Lorsqu'on veut se servir de cette éponge, on défait le nœud qui est à l'un des bouts de la ficelle, et on la déroule jusqu'à ce qu'on ait mis à découvert la quantité d'éponge dont on a besoin : on arrête ensuite la ficelle par un autre nœud, afin que l'éponge, qui ne doit pas servir pour le moment, puisse toujours être comprimée.

Sirup d'extrait aqueux d'opium (diacode.)

Prenez extrait d'opium aqueux 64 gr^m (2 onces)
 Sirop de sucre 15 kil^m (30 livr.)

Faites chauffer le sirop; lorsqu'il est bouillant, ajoutez l'extrait d'opium, délayé préalablement dans une très petite quantité d'eau; passez ensuite le sirop à l'étamine.

Le sirop diacode, préparé avec les têtes de pavots, fermentent et moisit facilement : d'ailleurs, il est susceptible de varier dans ses effets, à cause de l'impossibilité d'avoir constamment ces capsules au même point de maturité. Celui préparé avec l'opium du commerce, est également défectueux.

Ce sirop contient par 32 grammes (1 once) un décigramme environ (2 grains) d'extrait d'opium aqueux.

Sirup tartareux.

Prenez sirop de sucre ou sirop

simple 1 kil^m (2 livres)

Acide tartareux concret . . . 50 gr^m (5 gros.)

Eau distillée d'écorce de citron 64 gr^m (2 onces.)

Mélez la solution de l'acide dans l'eau de citron, avec le sirop simple bien cuit.

Ce sirop contient environ 6 décigrammes (12 grains) d'acide tartareux par 32 grammes (1 once); il donne, mêlé avec douze fois son poids d'eau, une limonade très agréable, qui remplace avantageusement dans les pays du Nord, celle faite avec le suc de citron.

Sirup asorifique (ou de cuisinier.)

Prenez salsepareille 2 kil^m (4 livres.)

Séné mondé 8 gr^m (2 gros.)

Anis 8 gr^m (2 gros.)

Miel blanc } de chaque 3 kil^m (6 livres)

Sucre }

On coupe la salsepareille longitudinalement et transversalement, on la fait macérer, puis infuser douze heures dans eau, 4 kilogr. (8 livres); avec le produit de cette macération et infusion, on fait un sirop avec le sucre, que l'on clarifie et que l'on verse bouillant sur le séné et l'anis; après douze heures d'infusion, on passe ce sirop.

D'autre part on fait plusieurs décoctions de salicoparville restante, on verse ces décoctions sur le marc des feuilles et semences, afin d'en extraire la totalité des principes solubles qu'elles auroient pu retenir; on passe et on fait un sirop avec le miel, que l'on ajoute au premier; c'est par ce procédé que l'on peut obtenir toutes les parties extractives et aromatiques des substances qui entrent dans ce médicament.

Oxymel simple.

Prenez miel blanc 6 kil^{gr} (12 livres.)

Vinaigre blanc 1 kil^{gr} $\frac{1}{2}$ (3 livres.)

Faites liquéfier le miel à une douce chaleur avec le vinaigre, dans un vase de faïence; amenez-le insensiblement à la consistance de sirop; écumez, passez à travers le blanchet, et conservez pour l'usage.

C'est sur-tout dans les préparations de ce genre qu'il faut éviter de se servir de vaisseaux de cuivre ou de terre vernissée.

Oxymel scillitique.

Il se prépare de la même manière que l'oxymel simple, en substituant au vinaigre ordinaire le vinaigre scillitique.

Considérations

Considérations sur les Extraits.

On ne décrit pas ici en détail les diverses manipulations employées dans la préparation des extraits, il suffira de rappeler au pharmacien, les règles générales qu'il doit observer, pour donner à ces médicaments le degré de perfection dont ils sont susceptibles.

Lorsqu'on aura à traiter des plantes succulentes, telles que le pissenlit, le cerfeuil, la fumeterre, il faudra cueillir ces plantes à l'époque où elles sont en pleine végétation, les nettoyer exactement, les laver, les piler dans un mortier de marbre, les mettre à la presse, enfermées dans de sacs de crin, après y avoir ajouté quelques brins de paille. On les dépouillera à une douce chaleur, on passera le suc au blanchet, et on le fera évaporer d'abord sur un feu doux, jusqu'à consistance de syrop clair; pour en achever l'évaporation au bain-marie.

Les plantes extrêmement mucilagineuses, telles que la bourrache, etc. exigent l'addition d'un peu d'eau pour donner plus facilement leurs sucs, et le secours de l'albumine ou blanc d'œuf pour leur clarification.

Il est nécessaire de piler et de soumettre à une légère decoction les plantes peu succulentes,

et après avoir clarifié et filtré au blanchet la liqueur, on l'évapore avec les précautions indiquées plus haut. Il y a de l'avantage à employer les mêmes plantes sèches, elles fournissent une grande quantité d'extrait.

Les racines, les bois, les écorces, et en général toutes les substances sèches doivent être broyées, et mises ensuite à macérer pendant quelque temps dans l'eau; on pourra même les faire bouillir légèrement, en procédant avec ménagement à l'évaporation de l'eau employée comme dissolvant de la partie extractive; dans cette circonstance, il est prudent de ne pas employer des vaisseaux évaporatoires en cuivre, parce qu'ils seroient attaqués par l'acide à nud que contiennent presque tous les extraits.

Lorsque les extraits sont sur le point d'être achetés, et avant de retirer l'évaporatoire du bain-marie, il convient d'y ajouter quelques cuillerées d'alcool à vingt-quatre degrés, en agitant fortement le mélange. Par ce moyen l'on obtient des extraits bien unis et susceptibles de se conserver sans se moisir.

Extrait de genévre.

Il s'obtient par la macération et l'agitation dans l'eau de chaux récepsée de cet arbrisseau, que l'on a préalablement concassés; la liqueur par-

se simplément à travers un blanchet, évaporée à petit feu, fournit un extrait sucré et aromatique; il seroit âcre et résineux, si, pour le préparer, on avoit recours à la chaleur de l'ébullition.

Extrait calmant d'opium.

Lorsqu'on veut prendre l'opium plus calmant que narcotique, on le soumet à l'opération suivante :

On expose l'opium coupé par tranches sous le robinet d'une fontaine, qui ne donne qu'un petit filet d'eau, on le malaxe; sa partie extractive se dissout, sa résine reste dans les mains, on filtre la liqueur et on évapore en consistance d'extrait.

Extrait de ciguë.

On prend la quantité que l'on veut de grande ciguë lorsqu'elle commence à fleurir, on la pile dans un mortier de marbre avec un pilon de bois, et on la soumet à la presse; le suc exposé à une douce chaleur, est passé à travers un linge, et on fait épaisir la liqueur jusqu'à la consistance sirupeuse; alors on y délaye la magma qu'on a séparé pendant la dépuratlon, et on continue de tenir le tout sur le bain-marie, en remuant continuellement jusqu'à ce que le tout soit parvenu à la consistance qu'exige cette sorte de médicament.

Cet extrait étoit préparé par Storck, avec le suc trouble de la plante, mais il vaut mieux l'évaporer après l'avoir déparé à chaud, y mêler sur la fin la fécula verte mêlée à part, comme on vient de le dire.

Les pilules de cigue ne sont autre chose que cet extrait divisé par décigramme (2 grains); on en prescrit depuis trois jusqu'à vingt et trente.

TEINTURES.

Teinture de gentiane.

Prenez racine de gentiane . . 64 gr^m (2 onces.)

Écorce d'orange 32 gr^m (1 once.)

Alcool à 20 degrés 1 kil^g 323 livres.)

La gentiane et l'écorce d'orange étant grossièrement pulvérisées sont mises dans un matras, avec la moitié de l'alcool indiqué. Le vase reste pendant six jours exposé au soleil ou à la chaleur du bain de sable, en l'agitant souvent; on décante et on recommence la digestion pendant le même espace de temps, en versant sur le marc l'autre moitié d'alcool. On exprime fortement; on réunit les deux liqueurs pour les filtrer et les distribuer dans des bouteilles de la capacité d'un double décilitre (demi-setier), qu'on bouche et qu'on place dans un lieu frais pour l'usage.

Tincture de cannelle.

Prenez cannelle de Chine concassée 95 gr^m (3 onces.)
 Racine d'angelique concassée
 de Nîort 15 gr^m (½ once.)
 Alcool à 20 degrés 1 kil^m (3 litres.)
 Procédez comme ci-dessus.

Tincture d'absinthe.

Prenez sommités sèches d'absinthe coupées menues . . . 125 gr^m (4 onces.)
 Alcool à 20 degrés 1 kil^m (3 litres.)
 Procédez comme ci-dessus.

Tincture de raffort composée.

Prenez racine fraîche de rai-
 fort coupée par tranches . 34½ gr^m (12 onces.)
 Ecorces d'orange 32 gr^m (1 once.)
 Alcool au consistant 2 kil^m (4 litres.)
 Procédez comme ci-dessus.

Tincture de quinquina.

Prenez quinquina concassé . . 255 gr^m (8 onces.)
 Ecorces d'orange 32 gr^m (1 once.)
 Alcool à 20 degrés 1 kil^m (2 litres.)
 Procédez comme ci-dessus.

Tincture de scilles.

Prenez squames de scilles
 séchées et coupées menues, 250 gr^m (8 onces.)
 Cannelle de Chine 32 gr^m (1 once.)
 Alcool à 20 degrés 1 kil^m (3 litres.)
 Procédez comme ci-dessus.

Tincture vulnéraire (Eau vulnéraire).

Prenez espèces vulnéraires . . . 95 gr^m (3 onces.)

Versez dessus alcool à 24 degrés . . 2 kil^m (4 livres.)

Mettez en digestion pendant huit jours, passez avec forte expression, filtrez et conservez pour l'usage.

Tincture alcoolique de cantharides.

Prenez cantharides pulvérisées grossièrement 48 gr^m (1 once $\frac{1}{2}$.)

Baies de genièvre capsaules . . 30 gr^m (1 once.)

Alcool à 20 degrés 4 kil^m (8 livres.)

Laissez macérer pendant dix à douze heures; filtrez la liqueur et conservez la pour l'usage.

Cette teinture dans laquelle on fait entrer les baies de genièvre pour en masquer l'odeur, peut-être aussi pour en modérer l'action et suppléer le camphre, n'exige pas seulement dans son usage en frictions beaucoup de prudence; il conviendrait encore que le dissolvant soit toujours plus aqueux qu'alcoolique, et de n'employer que la macération, précautions sur lesquelles on ne sauroit trop insister, attendu que si on les négligeoit, on courroit le risque d'introduire dans cette teinture d'autres matériaux immédiats des cantharides qui pourroient nuire à l'effet principal qu'on desire obtenir.

*Tincture anodine de Sydenham ou laudanum
liquide.*

Prenez opium coupé menu . . . 64 gr^m (2 onces.)
 Safran incisé 16 gr^m (4 gros.)
 Cannelle concassée 8 gr^m (2 gros.)
 Clous de girofle 4 gr^m (1 gros.)
 Vin muscat 1 kil^m (1 litre.)

Mettez le tout dans un vase, et faites macérer pendant huit à dix jours en agitant souvent le mélange, / passez avec expression, et ensuite filtrez la liqueur, qui devra être conservée dans une bouteille bouchée.

Note. A défaut de vin muscat, on prendra 448 grammes de bon vin blanc (14 onces), et 64 grammes (2 onces) d'alcool à 50 degrés.

Tincture² de myrrhe.

Prenez myrrhe concassée . . . 32 gr^m (3 onces.)
 Alcool à 20 degrés 1 kil^m (1 litre.)

Faites digérer cette substance pendant huit jours dans un vaisseau bouché que vous exposerez au soleil ou à une douce chaleur, ensuite passez avec expression, et filtrez la liqueur qui devra être conservée dans une bouteille bien bouchée.

On prépare de la même manière la teinture d'aloes qui, mêlée à parties égales avec celle de

myrthe, forme la teinture de myrthe et d'adota mède.

Vinaigre scillitique.

Prenez squammes de scille
séchées et coupées en—

masse 64 gr^m (2 onces.)

Vinaigre de bonne qualité. 1 kil^m 256 gr^m (livr. 4.)

Mélez le tout dans un matras, et laissez digérer pendant huit jours, soit au soleil, soit à la douce chaleur d'un bain de sable, filtrez la liqueur, ajoutez-y :

Alcool à 35 degrés 64 gr^m (2 onces.)

Conservez-la dans des vases bien bouchés.

Il en est des vinaigres composés comme des vins médicinaux, suivans l'ancien mode; ils sont, par leur essence, susceptibles de s'altérer promptement. Il convient donc de ne préparer le vinaigre scillitique, que peu à la fois et à mesure des besoins, sans quoi on s'exposeroit à n'employer qu'un médicament infidèle.

EMPLÂTRES.

Empiâtre simple.

Prenez oxide de plomb demi-

vireux (litharge) 2 kil^m $\frac{1}{2}$ (5 livres.)

Huile d'olive 5 kil^m (10 livres.)

Eau quantité suffisante.

Faites cuire à grande eau, jusqu'à ce que la

libre soit parfaitement dissoute, et que la masse emplastique ne s'attache plus aux doigts.

Cet emplâtre peut servir d'excipient pour toutes les substances avec lesquelles on désireroit augmenter l'action des topiques de ce genre.

Emplâtre mercuriel.

Prenez emplâtre simple. . . . 2 kil^m (4 livres.)
 Cire jaune. 320 gr^m (12 onces.)
 Mercure. 2 kil^m (4 livres.)

Reignez le mercure dans suffisante quantité d'onguent mercuriel, incorporez le tout à l'emplâtre qu'on aura fait liquéfier avec la cire, sur un feu très-doux, et dans un vaisseau de terre ou de fer.

Emplâtre diachylum.

Prenez emplâtre simple. . . . 2 kil^m (4 livres.)
 Cire jaune. }
 Poix résine. } de chaque. . . . 96 gr^m (3 onces.)

Faites fondre le tout sur un petit feu.

D'un autre côté,

Prenez gomme. }
 G. ammoniacque. }
 Sagapenum. . . } de chaque 96 gr^m (3 onces.)
 Térébenthine. . }

Les gommes résines préalablement dissoutes dans du vinaigre, passées et épaissies en consistance requise, seront parfaitement délayées

la térébenthine prescrite; puis ajoutez avec les précautions usitées, à la masse qu'on aura laissé refroidir à demi.

Emplâtre de ciguë.

Prenez poix résine. 1 kil^m (3 livres.)
Cire jaune. 1 kil^m (2 livres.)
Poix blanche. $\frac{1}{2}$ kil^m (1 livre.)
Extrait de ciguë. $\frac{1}{2}$ kil^m (1 livre.)

Faites liquéfier toutes ces substances dans une bécasse, et passez le mélange avec expression.

Ajoutez avant le refroidissement,

Gomme ammoniac en poudre. $\frac{1}{2}$ kil^m (1 livre.)

Mélez le tout exactement, et formez des magdaléons.

Emplâtre de savon.

Prenez emplâtre simple. 3 kil^m (8 livres.)
Savon blanc et dur. $\frac{1}{2}$ kil^m (1 livre.)

Fondez-les ensemble, et faites cuire jusqu'à consistance d'emplâtre.

Si on se bornoit à liquéfier l'emplâtre, et à y mêler le savon râpé, sans cuisson, il en résulteroit une décomposition qui enlèveroit au mélange la consistance requise.

Emplâtre de savon campé.

Toutes les fois qu'on pégre à propos de camphrer l'emplâtre de savon, et généralement tous les emplâtres, il faut les liquéfier à une douce chaleur, diviser le camphre à l'aide d'un peu d'huile, et l'y introduire dans la proportion d'un gramme (18 grains) par 64 grammes (2 onces) d'emplâtre; mais il convient, à cause de l'extrême volatilité de cette huile concrète, de n'en faire l'addition qu'à mesure des besoins.

Emplâtre vésicatoire.

Étendez une portion d'emplâtre simple sur un morceau de peau ou de linge, et saupoudrez-en la surface avec des cantharides pulvérisées grossièrement, depuis un gramme (18 grains) jusqu'à 2 grammes (1 gros), suivant la largeur de l'emplâtre.

L'expérience a fait connaître qu'on perdoit beaucoup de cantharides en les incorporant avec les résines qui constituent la préparation désignée sous le nom d'emplâtre vésicatoire; qu'il étoit plus économique d'en saupoudrer la surface au moment où il s'agit d'en faire l'application, parce que ce n'est que la partie qui touche immédiatement la peau qui agit, que l'autre

se trouve amortie par l'espèce de vernis résineux qui l'entoure, et que l'effet de l'emplâtre devoit d'autant plus prompt et plus énergique, que la poudre employée étoit moins fine.

Emplâtre pour les bougies.

Prenez oxide de plomb demi-

vitreux et porphyrisé. . . 125 gr^m (4 onces.)

Suif 64 gr^m (2 onces.)

Cire jaune. 64 gr^m (2 onces.)

Huile de noix. 32 gr^m (1 once.)

Cet emplâtre a été long-temps reconnu pour la plus propre à faire des bougies, mais on préfère celles dites de gomme élastique, qu'on trouve maintenant dans le commerce.

Emplâtre agglutinatif.

Prenez poix résine. 4 kil^g (1 livre)

Résine élém. 125 gr^m (4 onces.)

Térébenthine. 64 gr^m (2 onces.)

Faites fondre le tout sur un feu doux, passez à travers un linge, et conservez dans un pot pour l'usage.

Sparadrap.

Prenez emplâtre simple. 4 kil^g (1 livre.)

Huile d'olive fine. 32 gr^m (1 once.)

Térébenthine. 32 gr^m (1 once.)

Disposez une planche de 85 centimètres de long, sur 22 centimètres de large; faites qu'une

des surfaces de la planche soit très-lisse. Enfoncer sur les bords, à 3-8 centimètres de distance, deux broches de fer de 15 millimètres de hauteur, pour retenir un cylindre semblable à celui qui sert à brayer le chocolat.

Pour préparer le sparadrap, mettez de chaque côté des broches, une carte pour élever le cylindre; disposez une bande de toile fine de la longueur que vous voudrez, de manière qu'une des extrémités puisse être saisie facilement; versez promptement l'emplâtre spécifié légèrement et le plus près possible du cylindre, tirez la toile un peu horizontalement; faites ensuite sécher le sparadrap sur une corde tendue.

A défaut de sparadrapier, il faut attacher des bandes de toile fine sur les bords d'une table, faire liquéfier l'emplâtre, ajouter l'huile et la térébenthine, verser et étendre sur la toile, avec un couteau de fer légèrement chauffé, liser enfin la toile avec un cylindre de bois bien uni.

ONGUENS.

Onguent antipsorique.

Prenez soufre sublimé. : 1 kil^{me} (2 livres.)
 Sel marin décrépit. 4 kil^{me} (1 livre.)
 Graisse de porc. 4 kil^{me} (8 livres.)

Porphyriser le sel marin décripé avec un peu d'axonge, faites ensuite fondre la graisse, et mêlez le tout exactement dans une terrine vernissée.

La dose pour chaque friction sera de 8 grammes (2 gros), une ou deux fois par jour d'abord, ensuite tous les deux jours; à défaut de graisse de porc, on fera un mélange d'huile et de suif de bœuf ou de mouton, jusqu'à consistance convenable.

Toute pommade dans laquelle entre le soufre, sous quelque forme que ce soit; suffit au traitement de la gale; l'onguent citra-mercurel, malgré la circonspection avec laquelle on en fait usage quelquefois, entraîne dans trop d'inconvénient pour l'admettre au nombre des antipsoriques.

Pommade anti-optalmique.

Prenez oléat. 5a gr^m (1 once.)
 Antimoine porphyrisé. . . 10 décig^m (20 grains.)
 Précipité rouge. 3 décig^m (6 grains.)
 Safran oriental en poudre. 12 décig^m (24 grains.)
 Formez du tout une pommade pour l'usage.

Pommade épileptique.

Prenez axonge. 2 kil^m (4 livres.)
 Castorides entières. 128 gr^m (4 onces.)
 Faites liquéfier l'axonge, placez le mélange

à une température qui le maintienne dans l'état liquide pendant vingt-quatre heures, en prenant la précaution de l'agiter de temps en temps; passez ensuite à travers un linge, et conservez pour l'usage.

Onguent d'Aroëus.

Prenez saif de montan 1 kil^m (2 livres.)
 Térébinthine. }
 Résine élémi. } de ch. $\frac{1}{2}$ kil^m et 250 gr^m (1 l. 8 onces.)
 Graisse de porc $\frac{1}{2}$ kil^m (1 livre.)

Faites liquéfier ensemble toutes ces substances à une chaleur modérée; passez à travers un linge, et agitez l'onguent jusqu'à ce qu'il soit entièrement refroidi.

Onguent basilicum.

Prenez poix noire. }
 Poix résine. } de chaque 125 gr^m (5 onces.)
 Cire jaune. }
 Huile d'olive. $\frac{1}{2}$ kil^m et 250 gr^m (1 l. 8 onces.)

Faites fondre et bouillir légèrement ensemble toutes ces substances et passez à travers un linge.

On trouvera au fond de la bassine une matière noire qui s'est séparée de la poix; c'est une sorte d'extracto-résine que l'huile ne dissout pas.

Onguent de la mère.

Prenez graisse de porc.	} de ch. 250 gr ^m (8 onces.)
Beurre non salé.	
Cire jaune.	
Suif de mouton.	
Litharge en poudre fine.)	
Huile d'olive.	4 kil ^m (1 livre.)

Mélangez toutes ces substances dans une grande bassine, à l'exception de la litharge; faites-les chauffer jusqu'à ce qu'elles fument, ajoutez alors peu à peu la litharge, remuez continuellement, jusqu'à ce que cet oxide de plomb soit parfaitement dissous, et que l'onguent ait acquis une couleur d'un brun foncé.

Onguent de styrax.

Prenez huile de soit.	350 gr ^m (11 onces.)
Colephane.	½ kil ^m (1 livre.)
Résine éléod.	} de chaque. . . 224 gr ^m (7 onces.)
Cire jaune.	
Faites fondre à petit feu, et ajoutez sur la fin,	
Styrax liquide.	250 gr ^m (8 onces.)
Passez et agitez jusqu'au refroidissement.	

Onguent mercuriel.

Prenez mercure	} de chaque parties égales.
Azouge de porc.	

Triturez dans un mortier de fer, jusqu'à ce que

que les globules de mercure aient entièrement disparu, ce dont on s'assurera avec la loupe.

Cérat.

Prenez huile d'olive. 4 kil^m (1 livre.)

Cire jaune. 96 gr^m (3 onces.)

Eau. 150 gr^m (5 onces.)

Faites fondre sur des cendres chaudes la cire jaune dans l'huile d'olive, coulez ce mélange dans un mortier de marbre; remuez-le avec un pilon de bois jusqu'à ce qu'il soit refroidi, et qu'il ne paraisse plus aucune grumeaux; alors ajoutez-y l'eau peu à peu, jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée, et que le cérat soit homogène.

Récolte des Plantes et des Cantharides.

Le printemps invite à faire la récolte des plantes indigènes. La liste de celles employées dans les pharmacies militaires n'est pas considérable, on en compte à peine une centaine, et de ce nombre, il en est quelques-unes dont il ne faut faire qu'une faible provision, tandis que d'autres doivent être cueillies avec surabondance. Il s'agit donc de calculer l'emploi de chacune d'elles, et de faire en sorte que ce calcul soit toujours la mesure de la collection. On se

bornera à quelques conseils sur la manière d'y procéder.

Parmi les plantes médicinales les plus usitées, les unes se plaisent dans les bois, les autres dans les marais; celles-ci dans les plaines, celles-là sur les montagnes; il en est qui croissent au fond et à la surface des eaux.

C'est dans ces lieux qui sont propres à chacune d'elles, qu'il faut les faire ramasser, plutôt que dans les jardins, où on les fait venir par artifice, et où elles ne peuvent acquiescer au même degré, ni les principes qui les constituent, ni les propriétés qui doivent les caractériser. Voici les règles générales établies pour la récolte, la dessiccation et la conservation des plantes.

Les feuilles sont prises dans leur plus grande vigueur un instant avant la floraison.

On doit cueillir les fleurs quand elles sont sur le point de s'épanouir, excepté les roses rouges qu'on demande en boutons.

Les fruits sont pris dans leur parfaite maturité, à moins que leur principale vertu n'existe dans l'astringence de leur suc, comme le fruit d'acacia.

Les racines sont tirées de terre à l'automne, sauf quelques exceptions déterminées par la durée des plantes qui les fournissent, et par les

lieux dans lesquels ces plantes germent, croissent, vivent et meurent.

On préfère les substances ligneuses, lorsqu'elles sont saines, et proviennent de sujets ni trop jeunes, ni trop vieux.

Les écorces enlevées aux branches et nouvellement séchées, sont plus estimées que celles fournies par le tronc.

Les semences sont ramassées au moment où elles vont se répandre.

Lorsqu'on veut conserver les plantes ou leurs parties, il est nécessaire d'en enlever l'eau de végétation et de les dessécher.*

On y réussit en les exposant, en raison de leur nature, à l'action de l'air atmosphérique, à la chaleur du soleil, à celle de l'étuve, ou à celle du four.

1°. Les plantes qui contiennent beaucoup d'humidité seroient exposées à subir une fermentation qui altéreroit leurs qualités ; si on les soumettoit à une dessiccation lente ; on la rend plus prompte, en les plaçant sous des châssis de toile au soleil, et quelquefois ensuite sur le dessus d'un four ayant 40 ou 50 degrés.

2°. On se hâte moins pour les plantes peu abondantes en sève aqueux, et sur-tout pour celles qui sont aromatiques ; on les sèche à l'ombre.

3°. On a soin d'envelopper de papier celles dont on veut dessécher les sommités, à cause de l'odeur et de la couleur, qui sont très fugaces; telles sont les menthes, la petite centaurée, le millepertuis, etc.

4°. On traite les fleurs séparées de leurs tiges, comme les feuilles; dessiccation prompte pour celles qui sont aqueuses, telles que les fleurs de mauve, de lis, de pavot rouge; dessiccation lente pour celles qui ont moins d'eau, comme la camomille.

5°. On emploie la dessiccation accélérée pour les écorces, les bois et les racines qui ne sont point aromatiques.

Quant aux racines, toutes sont lavées, nettoyées, et quelques-unes retisées, avant d'être soumises à l'opération qui doit les priver de leur humidité surabondante.

Les peches sont enfilés; celles qui ont un coeur ligneux, on le leur enlève en les fendant longitudinalement; celles qui sont charnues, sont coupées par tranches minces, et celles qui sont bulbeuses, effeuillées, divisées par lamelles ou transversalement.

6°. On étend dans un grenier bien aéré les semences émulsives pourvues de leurs enveloppes, fussent-elles ligneuses, mais sans leurs parties charnues. On opère de même pour les

semences farineuses, bien mûres, et séparées de leurs bêtes.

On dessèche à l'œuvre les semences mucilagineuses; au soleil, les autres graines inodores; et à l'ombre, celles qui sont aromatiques ou douées d'un principe âcre et volatil.

7°. On obtient l'assiccation de la plupart des fruits en les exposant successivement, et à plusieurs reprises, à la chaleur ménagée d'un four et à celle du soleil; aux uns on conserve leur peau, les prunes; on en dépouille les autres, les pommes, les poires.

8°. Il est des racines, comme celles des orchis, pour faire le salep, par exemple, qu'on enfle et qu'on plonge dans l'eau bouillante avant de les faire sécher.

Ce procédé, introduit dans l'économie domestique, pour la dessiccation des haricots verts, des jeunes fèves de marais, etc., nous procure l'avantage de manger, au milieu de l'hiver, ces légumes presque dans le même état de couleur et de saveur qu'ils ont en été.

Quand on a employé toutes les précautions indiquées pour la dessiccation de ces diverses substances, il convient, avant de les reformer, de les secouer sur une toile pour en séparer le sable, la terre et les œufs d'insectes qui pourroient s'y trouver mêlés, sans quoi les roses rouges, les

coquilleux, par exemple, etc., seroient bientôt altérés.

Des cantharides.

Quoique les cantharides appartiennent plus spécialement aux contrées méridionales, on en voit cependant assez vers le Nord, pour mériter qu'on s'occupe par-tout de les récolter.

C'est dans le courant de boréal que les cantharides se réunissent pour préliminer à leur accouplement; il faut donc savoir saisir cet instant pour en faire la récolte, particulièrement le soir au coucher du soleil, ou le matin à son lever; ce scarabé, car ce n'est point une mouche, varie prodigieusement pour la grandeur. La nature l'a superbement habillé: tout son corps est d'un beau vert luisant, azuré, mêlé de couleur d'or, à l'exception de ses antennes, qui sont noires.

Les cantharides, dont on fait usage dans la pharmacie, ont environ neuf lignes de longueur, sur deux ou trois de largeur; elles se jettent sur les frênes, les chèvrefeuilles, les lilas, les rosiers, les peupliers, les noyers, les érèbres, les ormeaux, dont elles dévorent les feuilles, et souvent lorsque cette pâture leur manque, elles se jettent sur les blés, les prairies, et leur causent de grands dommages: l'intérêt de l'agriculture réclamerait donc leur destruc-

tion, si la médecine ne trouvoit dans ces insectes, une de ses ressources les plus importantes qu'aucun objet jusqu'à présent n'a pu remplacer.

De leur récolte.

Comme les cantharides périssent par essaims, qu'elles sont précédées par une odeur fétide, approchant de celle de la souris, il est facile de les découvrir et de les ramasser, moyennant quelques précautions qu'il est prudent de ne jamais négliger.

Il y a deux manières de procéder à la récolte des cantharides; la plus simple consiste à étendre sous l'arbre chargé de ces insectes, un ou plusieurs draps, sur lesquels on les fait tomber en secouant les branches; on les expose ensuite sur un tamis de crin, à la vapeur du vinaigre, qui les fait mourir, ou bien on les réunit dans une toile claire, qu'on trempe à diverses reprises, dans un vase rempli de vinaigre coupé avec de l'eau; c'est la pratique la plus généralement adoptée.

La seconde méthode de récolter les cantharides est plus embarrassante et plus dispendieuse que la première: on étend des toiles sous les arbres, et tout autour on met du vinaigre en évaporation; on le faisant bouillir dans des terrines placées sur des réchauds, on secoue les

L'action de l'air et de la chaleur, et la présence de ce muqueux les rancissent facilement.

3°. Il mettra les eaux distillées simples, dans des bouteilles bouchées en papier ou parchemin, et non exposées au grand jour.

L'action de la lumière fait naître dans ces eaux une végétation verdâtre ; et les bouchons de liège humectés par l'eau en évaporation, prennent et communiquent aux eaux une odeur de mois.

4°. Il placera les sucs acides et vixeux dans un endroit froid. Les bouteilles des premiers, droites et recouvertes d'une couche d'huile ; les autres couchées et fermées par de bons bouchons de liège.

Ces deux espèces de sucs, sans ces précautions, s'altéreroient en peu de temps.

5°. Il prendra des flacons bouchés en cristal pour contenir les alcools, les teintures, les liqueurs éthérées et celles qui contiennent des gaz, à cause de leur disposition à perdre par l'évaporation ce qu'ils ont de plus subtil.

6°. Il gardera dans un lieu froid et non humide, les bouteilles parfaitement remplies des sirops et des miels.

L'humidité les décuirait, les feroit moisir ; la chaleur les feroit fermenter, et le gaz qui se développeroit alors, trop retenu par les bouchons de liège, briseroit les vases.

7°. Il choisira pour les conserves, les extraits, les électuaires et les pilules, des pots de faïence, qu'il couvrira de parchemin et de papier, et qu'il logera à l'abri de l'humidité; qu'il visitera de temps en temps pour les réparer au besoin.

8°. Il garantira, autant qu'il lui sera possible, les graisses, les cires, les onguens, les emplâtres, de l'impression de l'air atmosphérique, qui altère leur couleur, détermine leur prompte oxigénation, et change leurs propriétés.

9°. Il emploiera des flacons bouchés en cristal, pour les acides, les alkalis, les dissolutions métalliques, qui rongeraient les bouchons de liège; pour les sels qui s'effleurissent, pour ceux qui attirent l'humidité, pour la chaux et la magnésie, qui tendent à redevenir des carbonates, etc.

10°. Il couvrira de papier noir les flacons contenant de l'acide muriatique oxigéné, et les sels métalliques auxquels la lumière enlève de l'oxigène.

Observations sur la conservation des médicamens magistraux.

1°. Le pharmacien les préparera à mesure du besoin, en se servant de vaisseaux et d'instrumens appropriés aux opérations dont ils sont

les produits, et absolument incapables de rien communiquer de nuisible.

2°. Il exercera ses sens à reconnaître l'état de perfection convenable à chaque médicament, afin de pouvoir avec justice rejeter ceux qui ont subi la moindre altération, sur-tout celle qui a lieu souvent par un changement subit de l'atmosphère.

3°. Il surveilla que les liquides soient distribués aux malades, dans des bouteilles de verre, nettoyées, bouchées et étiquetées convenablement.

Si, par des circonstances particulières, il étoit obligé de les remplacer par des bouteilles de grès, comme celles-ci se pénéraient et s'infectant facilement, il les fera laver soigneusement après les avoir laissé tremper dans l'eau chaude alcaline, ce qui l'obligera d'avoir de ces bouteilles de rechange.

4°. L'usage des pots de grès sera interdit, parce qu'ayant une ouverture considérable, couverte seulement d'une feuille de papier, jusqu'en lit des malades, ces pots se remplissent de mouches et de poussière.

Parce que ne pouvant passer, comme aux bouteilles, des étiquettes au col de ces pots, on est obligé de les ranger dans des caisses, suivant les numéros des lits, et par conséquent

de couvrir continuellement les risques de commettre des erreurs.

Parce qu'enfin, s'il falloit coller des étiquettes sur chacun des pots, la service ne seroit jamais terminée pour les heures de la distribution des alimens.

Observations sur les médicamens externes confiés aux Elèves en chirurgie.

Les élèves ne demanderont des emplâtres, des onguens et des huiles qu'à mesure qu'ils en auront besoin ; ils les rangeront dans les tiroirs des armoires, coffres d'appareil, mis à leur disposition ; chaque compartiment destiné pour un emplâtre, sera étiqueté. Chaque emplâtre y sera enveloppé de papier et étiqueté.

Les onguens seront mis dans des pots de ténacité, tenus toujours très-propres.

La même spatule ne servira pour tous les onguens successivement sans avoir été nettoyée à chaque fois.

Ils ne demanderont que la quantité d'alcool camphré nécessaire aux pansements de chaque jour, et se garderont de le trop faire chauffer.

L'huile d'olive ne servant guère que pour faciliter l'introduction de la sonde, ils éviteront les abus qui augmentent ordinairement la consommation de cette huile.

Le sparadrap sera préparé dans le pharmacie de chaque hospice, afin qu'il soit chargé convenablement d'emplâtre, et qu'il ne soit pas couvert de poussière.

Ils veilleront à faire nettoyer souvent les vaisseaux contenant les cataplasmes, et à employer de ces topiques que la quantité strictement nécessaire; une trop grande masse de cataplasme gênant souvent et inutilement le malade.

Les pharmaciens ne délivreront, ni vin, ni alcool, ni lait, ni huile, ni sucre, ni miel, à moins que ces objets ne soient sous forme de médicament.

Les médicaments demandés pour les pansemens, et qui ne sont pas portés sur les cahiers de visite, ne seront délivrés que sur des bons particuliers, signés par les chirurgiens de service et visés par le chef.

Lorsqu'un cas urgent et imprévu forcera de délivrer les médicaments sur les bons des sous-aides, ceux-ci seront tenus de faire signer ces bons dès le lendemain de la livraison, par les chefs respectifs.

La pierre infernale ne sera jamais délivrée qu'au chirurgien en chef, qui seul doit en faire usage.

NOMENCLATURE DES MÉDICAMENS	QUANTITÉS		DESIGNATION		
	DE MÉDICAMENS		DES DROGUES		
Avec l'usage ou selon des briques médicinales.	pour donner une dose ou une dose composée de deux ou trois parties de deux à quatre ou six parties de deux parties.		à composer une dose ou une dose composée de deux à quatre ou six parties de deux parties.		
	Fonds médicament.		Fonds médicament.		
Acides	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
de Nitrique vulgaire.	$\frac{1}{2}$	3	...	...	...
Idem en poudre.	$\frac{1}{2}$	4	...	...	...
de Sulfurique.	2	4	...	...	...
de Sulfurique vulgaire.	...	...	...	...	...
Idem régal.	2	4	...	...	...
de Sulfur.	254	2	...	...	...
Idem en poudre.	...	...	...	...	...
de Sulfur.	2	4	...	...	...
de Sulfur.	...	...	...	...	...
de Sulfur.	...	...	...	...	...
Alc.					
de Sulfur régal.	2	4	...	...	...
Alc.					
de Sulfur vulgaire.	...	...	...	...	...
Idem en poudre.	254	2	...	...	...
de Sulfur.	...	...	...	...	...
de Sulfur.	...	...	...	...	...
d'Alc.	2	2	...	...	...
de Sulfur vulgaire.	10	20	...	...	...
Idem en poudre.	25	5	...	...	...
de Sulfur.	2	2	...	...	...
de Sulfur.	...	...	...	...	...
Froids					
d'Alc.	...	...	...	...	...

[illegible]

PHARMACENTIQUE

[illegible]

[illegible]

NOMENCLATURE		QUANTITES		DESIGNATION	
DES MEDICAMENS		DE MEDICAMENS		DES DROGUES	
dont l'usage est autorisé dans les hôpitaux militaires.		qui doivent être présentés aux comités de phar- macie pour être adoptés, l'approvisionnement de tous les services militaires par dans chaque hôpital.		à acheter à l'étranger ou les services militaires de l'hôpital.	
		Poids métrique	Poids usuel		
<i>Resines naturelles</i>		1	2	3	4
Gomme arabique		...	...	...	...
Trinitaire		5	4	...	...
<i>Resines fixes</i>					
Gomme gomme		3	6	...	...
<i>Resines volatiles ou essentielles</i>					
Camphre		1 1/2	3	...	...
de Térébenthine		256	8	...	...
<i>Substances maritimes</i>					
Serpène blanc		125	4	...	...
Serpène purpurin à l'eau		64	6	...	...
Mousse de Corne		1/2	1	...	...
<i>Substances animales</i>					
Oncocéphale		1 1/2	3	...	...
Serpène en poudre		1/2	4	...	...
Cerveau de chat séché		...	...	...	...
Serpène séché		...	...	...	...
Serpène		...	...	...	...
<i>Substances végétales</i>					
Andromède		...	...	...	...
Serpène purpurin		1/2	3	...	...

[illegible]

NOMENCLATURE DES MÉDICAMENS	QUANTITÉS DE MÉDICAMENS	DÉSIGNATION DES DROGUES
dans l'usage des soins dans les Épisodes Médicaux.	qui doivent être préparés avec soin composés de plus moins avec un matériau important de base à savoir sans aucune pré- dilection pour l'un ou l'autre.	à savoir à l'usage des soins dans les Épisodes Médicaux. à l'usage des soins dans les Épisodes Médicaux.
	Poids atomique.	Poids atomique.
<i>Poudre composée.</i>	1 2 3 4	
Anchoulique.	1	1
Cathartique.	1	1
Templeton.	1	1
Alcoolisme alcool.	1	1
<i>Alcoolisme et Composé.</i>		
Dissolvant.	1	1
Thérapique.	1 256	1
Composé de Rome (sage)	256	1
<i>Pilule.</i>		
de Cynglisme.	1	1
Mucosité.	1	1
de Rome.	1	1
Sulfurique.	1	1
Sol piquet.	1	1
<i>Trochisque.</i>		
de Rome.	1	1
<i>Extrait.</i>		
Amon.	1	1
de Cordon.	1	1
de Cigan.	256	1
de Cordon.	1	1
de Piquet.	1	1

FORMULAIRE

NOMENCLATURE DES MÉDICAMENTS	QUANTITÉS		DÉSIGNATION		
	DE MÉDICAMENTS		DES DEGRÉS		
deux-fois et même-fois les suppléments suivants :	qui doivent être pour une dose complète de plus pour un délai de plus de six à sept jours, suivant le cas.		à chaque semaine	à chaque mois	à chaque année
	Poids moyen	Poids moyen			
<i>Extrait.</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
de Guaiac	1	2	...	...	...
Opium brut	1/2	1	...	...	...
Extrait d'Opium	...	...	...	...	...
de Trille d'eau	1	...	...	...	...
<i>Opium.</i>					
Antipyrine et codéine gale	...	...	...	...	...
d'Acide en Opium	1/2	3	...	...	...
Extrait de Supplément Gale	1/2	3	...	...	...
de la Mer	1/2	3	...	...	...
Mercurel	1	4	...	...	...
Poppidon	1/2	4	...	...	...
de Sain	1/2	3	...	...	...
<i>Extrait.</i>					
Agglutinant	1	2	...	...	...
Extrait simplé	1/2	3	...	...	...
Extrait simplé	1/2	3	...	...	...
de Gale	1	2	...	...	...
Mercurel de Vigo	...	...	...	...	...
de Sain simplé	...	...	...	...	...
Trille	1	1/2	...	...	...
Extrait simplé	10	10	...	...	...
Sain simplé	10	10	...	...	...
Sain à Sain	1	1	...	...	...
Extrait	1	1	...	...	...

PHARMACEUTIQUE.

NOMENCLATURE	QUANTITÉS	DESIGNATION
DES MÉDICAMENS	DE MÉDICAMENS	DES DROGUES
dans 4 vases ou autres dans les bouteilles ordinaires.	pour doses com- pètes par doses comètes de phar- macie pour un hôpital comprenant de 200 à 500 malades par doses par mois Poids moyen Poids moyen	à employer à doses par les doses à employer à doses à doses
MÉDICAMENS CHIMIQUES.	1 2 3 4	
<i>Tinctures</i>		
de Cassia.	250	5
de Carduoides.	1	1
de Myrica et Falvia.	1	1
de Quinquina.	1	1
de Scilla.	250	5
Laudanum liquidum.	1	1
de Rhodi compo.	1	1
de Sassa.	1	1
d'Alumina.	1	1
<i>Succus aurifolia.</i>		
de Cassia.	1	1
de Tinctura.	1	1
<i>Miscela pura et aromatisée.</i>		
Alcool de vin (vulg. Ex- trait de vin).	1	1
Idem de melle (vulg. Eau de melle).	1	1
Idem valériane par infu- sion.	1	1

[illegible]

NOMENCLATURE DES MÉDICAMENTS	QUANTITÉS DE MÉDICAMENTS				DÉSIGNATION DES DROGUES		
	Les drogues sont prises dans les boîtes indiquées Les drogues sont prises dans les boîtes indiquées pour le plus grand nombre de doses à prescrire sont indiquées pour des doses multiples Boîte moyenne Boîte normale				Indiquer la posologie sur les boîtes des doses multiples	Indiquer la posologie sur les boîtes des doses multiples	Indiquer la posologie sur les boîtes des doses multiples
<i>Sels et autres préparations chimiques</i>	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
<i>Sel de sodium</i>	$\frac{1}{2}$		1		...	...	...
<i>Sulfate de soude (Fiorini)</i>	100		4		...	...	...
<i>Sulfate de fer (Fiorini)</i>	100		4		...	...	...
<i>Sulfate de zinc (Fiorini)</i>	...		...		...	...	...
<i>Sulfate de magnésie (Sel d'Epsom)</i>	15		30		...	...	...
<i>Sulfate de soude (Sel de Glauber)</i>	...		...		...	...	...
<i>Sulfate de zinc de soude</i> (Litharge moulée)					...	...	...
<i>Tartrate acide de potasse</i> (Crème de tartre)	8		4		...	...	...
<i>Sel de soude</i>					...	...	...
<i>Tartrate de soude (Sels de soude)</i>	100		4		...	...	...
<i>Tartrate acide de potasse</i> (Crème de tartre)	250		2		...	...	...
<i>Sel de soude</i>	...		...		...	...	...
<i>Sel de soude</i>	10		20		...	...	...
<i>Alcalis fixes et volatils</i>							
<i>Carbonate de potasse pur</i> (Vulg. Alkali fixe)	15		3		...	...	...
<i>Carbonate de soude pur</i> (Vulg. Alkali volatil)	100		4		...	...	...

N. B. Dans ce tableau général ne sont pas comprises les formules magistrales décrites dans la première et la seconde partie du Formulaire, de même que les drogues simples qui entrent dans la composition des médicaments officinaux destinés à être envoyés dans les hôpitaux militaires; on n'y a pas inséré non plus les plantes qu'on doit employer dans leur saison respective.

Une demi-division de pharmacie nécessaire au service d'un hôpital temporaire de cent cinquante à deux cents malades, sera composée de la moitié en poids des médicaments renfermés dans une division complète, à l'exception des utensiles, qui se trouveront en même nombre.

On a désigné par un astérisque les médicaments qui devront être achetés sur les lieux à mesure des besoins, ou composés dans chaque établissement, ou expédiés de Paris.

Les articles cependant qui devront former une division ou une demi-division de pharmacie, seront insérés en totalité dans les caisses, sans avoir égard à l'indication des substances annoncées devoir être achetées ou préparées sur les lieux.

Liste des médicaments qui doivent composer une subdivision de pharmacie à la suite des ambulances, pour administrer les premiers secours.

S A V O I R :

Ipécacuanha en poudre.	64 gr ^m	(2 onces.)
Agaric de chéne	256 gr ^m	(8 onces.)
Centaurides en poudre.	128 gr ^m	(4 onces.)
Colephane en poudre.	256 gr ^m	(8 onces.)
Acétate de plomb (vinaiyre de saturne)	1 kil ^m	(2 livres.)
Poudre purgative.	256 gr ^m	(8 onces.)
Thériaque.	256 gr ^m	(8 onces.)
Diaucordium.	256 gr ^m	(8 onces.)
Extrait de genévre.	256 gr ^m	(8 onces.)
Onguent mercuriel.	256 gr ^m	(8 onces.)
basilicum.	1 kil ^m	(2 livres.)
d'Arcena.	256 gr ^m	(8 onces.)
Empâtre agglutinatif.	256 gr ^m	(8 onces.)
diachalum gommé.	256 gr ^m	(8 onces.)
mercuriel.	256 gr ^m	(8 onces.)
Pâles mercurielles.	64 gr ^m	(2 onces.)
Baume de Fioraventi.	256 gr ^m	(8 onces.)
Tincture de Sydenham.	128 gr ^m	(4 onces.)
Camphre.	256 gr ^m	(8 onces.)
Alcool au camphre (eau-de-vie camphrée)	1 kil ^m	(2 livres.)
Alcool sulfurique distillé (liqueur d'Hoffmann)	64 gr ^m	(2 onces.)

Oxide d'antimoine sulfuré-rouge

(kerma) 32 gr^m (1 once.)

Nitrate d'argent fonde (pierre

infernale). 4 gr^m (1 gros.)

Acide tartareux. 64 gr^m (4 onces.)

Sulfate de zinc (vitriol blanc). 32 gr^m (1 once.)

Sulfate de cuivre (vitriol bleu). 32 gr^m (1 once.)

Ammoniaque (alkali volatil). 128 gr^m (4 onces.)

Sulfate d'alumine calciné (alum

calciné). 32 gr^m (1 once.)

Tartrate antimonié de potasse

(diatrique). 32 gr^m (1 once.)

Linge à panserment. 1 kil^m (2 livres.)

Charpie. 1 kil^m (2 livres.)

Un trébuchet.

Chaque division et demi-division de pharmacie devra en outre contenir les ustensiles ci-après :

Un petit mortier de marbre et son pilon en bois,

Un petit mortier de fer et son pilon.

Une boîte contenant poids et balances assortis.

Deux spatules de fer.

Deux anneaux d'étamine.

Un trébuchet garni.

MODÈLE DE CAHIER DE VISITE.

*Fièvre des Fièvres ou Blende, du premier
germinal.*

1802

Salle première.

N ^o du Lettre.	NOMS des MALADES.	NOM de jours depuis		ALIMENS du		REMÈDE et Principe.	Observations.
		1 ^{er} jour	2 ^e jour	E. ou F.	D. ou P.		
1	L. J. J. J. J. avec, régime d'infirmité, comp. G. J. J.	1	1	E. ou F.	D. ou P.	Traite par Séj. du bras à 6 heures, Lettre, J. J.	Traite par Séj. du bras à 6 heures, Lettre, J. J.
2	S. J. J.	12	12	S. J.	S.	Traite par Séj.	
3	D. J. J. avec, régime de convalescence, comp. L. J. J.	14	14	E.	F.	Traite par Séj.	Traite par Séj. après 7 jours, avec régime.
4	F. J. J. avec, régime de convalescence, comp. M. J. J.	14	14	E.	F.	Traite par Séj. de convalescence, d'un seul jour.	Traite par Séj. de convalescence, d'un seul jour.
5	N. J. J.	15	15	M. J.	R. L.	Traite par Séj. de convalescence, Lettre, J. J.	Traite par Séj. de convalescence, Lettre, J. J.
6	D. J. J.	16	16	Q. J.	Q. J.	Traite par Séj. de convalescence, Lettre, J. J.	Traite par Séj. de convalescence, Lettre, J. J.

Explication pour l'intelligence de ce modèle de cahier.

1^{re}. Pour que le médecin et le chirurgien faisant la visite, puissent voir d'un coup-d'œil le temps qu'a parcouru la maladie, et celui que le malade a passé à l'hôpital, le pharmacien aura soin d'ajouter chaque jour, avant la visite, une unité aux nombres mis le premier jour sur les colonnes respectives de l'entrée et de la maladie. L'explication des exemples suivans ne peut laisser aucune équivoque.

Lafont, n^o 1, entré le premier germinal, au troisième jour de sa maladie, demande 3 à la colonne du jour de la maladie, 1 à celle d'entrée. Le 2 germinal, il se trouvera 4 à la première colonne, et 2 à la seconde.

Simon, entré le même jour de l'invasion de sa maladie, le 21 ventôse, a 12 aux deux colonnes le premier germinal; le 2, il y aura 13 à l'une et à l'autre.

2^{re}. Le jour où le malade entrera et le jour de sa sortie, son nom sera suivi du n^o de son régiment et du nom de sa compagnie, comme on le peut observer aux numéros 1 et 3, *Lafont* et *Deschamps*. Il en sera usé de même le jour

de la mort, et on en indiquera l'heure à la colonne d'observations. Voyez *Fleury*, n° 4; on y ajoutera le nom de la maladie: *Dysenterie*.

3°. Le jour de l'entrée, on portera le principal symptôme sur la colonne d'observations, comme *Lafont*, n° 1, *Péritneumonie*, *douloureux aiguë au côté droit*.

4°. Le jour de la sortie, on inscrivra le nom de la maladie dont le soignant a été guéri. Exemple: *Deschamps*, n° 3, *Fèvre tierce*, *guérie après sept accès, sans quinquina*.

5°. Dans le cours d'une maladie, on fera mention d'un symptôme nouveau dont on ne se seroit pas encore aperçu. Exemple: *Millet*, n° 5, *Croûtes purulentes*.

6°. Lorsque le chirurgien en chef aura été appelé par le médecin, et réciproquement, on inscrivra brièvement la décision prise. Exemple: *Duchemin*, n° 6, *La paracentèse sera faite demain*.

7°. Le jour qu'un malade aura obtenu la permission de changer de lit, ou lorsqu'il viendra d'une autre salle, on en fera mention à la colonne des numéros des lits. Exemple: *Simon*, n° 2. — Du n° 37.

3°. Quoique les abréviations destinées à désigner les alimens soient indifférentes en elles-mêmes, cependant il est résulté des abus de leur variété arbitraire, lorsqu'on a voulu établir des comparaisons relatives aux consommations et aux comptabilités. Ensuite ces différences peuvent donner lieu à des équivoques de la part des médecins et des chirurgiens, en passant d'un hôpital à l'autre, lorsqu'un même signe seroit, comme on l'a remarqué, adopté dans l'un pour désigner la diète, dans l'autre un oeuf, ici la portion, là des pruneaux, etc.

Les abréviations suivantes seront les seules dont il sera permis de se servir lorsque les objets ne seront pas spécifiés nominativement.

P. Portion entière.

3/4. Trois quarts.

M. Demi-portion.

Q. Quart.

S. Soupe.

D. 2. 3. 4 b. Diète. Deux, trois, quatre bouillons.

R. g. Riz au gras.

R. L. Riz au lait.

L. Lait.

S. L. Soupe au lait.

Pr. Pruneaux.

EL. Bouillie.

Pia^{de} Panade.

O. Un œuf.

a O. Deux œufs.

V. Portion entière de vin.

$\frac{V}{2}$ Demi-portion de vin.

VB. Vin blanc, portion entière.

$\frac{VB}{2}$ Demi-portion de vin blanc.

La quantité de vin doit être désignée pour chaque distribution, comme celle des aliments.

9°. A l'égard des remèdes, il est des abréviations usitées de tous temps dans les hôpitaux militaires, et dont l'usage peut être continué, autant que les médecins et les chirurgiens qui y sont employés les adopteront; mais les quantités ne seront plus désignées par des caractères pharmaceutiques, ni les substances par des caractères chimiques. On ne se servira que des abréviations communes, et qui ne soient susceptibles d'aucune sorte d'équivoque.

10°. Enfin, indépendamment de la date placée en tête de chaque visite par le pharmacien qui la suit, le médecin et le chirurgien en chef qui l'auront faite, la dateront de leur main avant

112 FORMULAIRE PHARMACEUTIQUE.

de signer, et après l'avoir fait collationner devant eux par le pharmacien et le chirurgien qui l'auront suivie, afin de prévenir toute erreur dans le relevé des alimens que doit faire le chirurgien pour le remettre à l'économé après l'avoir signé.

Le premier vendémiaire de l'an XIII.

*Les inspecteurs généraux du service de santé
des armées,*

COSTE, HOUTELOUT, PARY, DUBOIS, LARAT, PARENT.

INSTRUCTION

INSTRUCTION

SUR LA

COMPTABILITÉ DES PHARMACIENS.

ARTICLE I.

Le Pharmacien chargé d'un service dans un hôpital doit tenir deux registres.

Dans le premier, il inscrit, jour par jour, nominativement et par ordre de dates, toutes les recettes qu'il fait, tant en denrées, qu'en médicaments. Ce registre doit être composé de 4 colonnes;

1. Ordre des dates;
2. Désignation des objets;
3. Quantités;
4. Observations.

Dans le second, il tient note des compositions officinales qui se font ordinairement dans les hôpitaux et qui ne peuvent se tirer de magasins, telles que vins médicinaux, sirops simples ou composés etc., conformément à ce qui est prescrit par le formulaire pour ces sortes de compositions; ce second registre doit être distribué en six colonnes;

1. Dates;
2. Désignation des compositions;
3. Dénomination des drogues employées;
4. Quantités;
5. Produits;
6. Observations.

Le Pharmacien doit se conformer strictement au formulaire pour tout ce qui concerne les compositions, et il n'oublie pas que ces deux registres doivent être cotés et paraphés par le Commissaire des guerres.

ART. 2.

Pièces justificatives des réceptions.

Les médicaments, soit qu'ils proviennent d'un dépôt, d'un hôpital supprimé ou enfin d'un fournisseur, sont toujours adressés au Directeur.

S'ils proviennent d'un fournisseur, leur réception ne peut avoir lieu qu'en présence du Commissaire des guerres et de deux Officiers de santé, au moins, lesquels jugent, si les médicaments sont de bonne qualité et conformes aux échantillons admis pour la fourniture. Le Procès-verbal de réception doit relater ;

1. Le nom du fournisseur ;
2. La date de son marché ;
3. Les noms des Officiers de santé présents à la réception ;
4. Les quantités de chaque objet délivré ;
5. Leur évaluation, tant aux prix d'achat, que d'après le tarif approuvé par S. E. le Ministre Ministre-Directeur, et la différence existante entre les deux évaluations.

ART. 3.

Lorsque les versements proviennent de dépôts ou d'autres hôpitaux, on doit s'enquêter, avant

sont, si les balles, caisses, tonneaux etc. sont bien du même poids, et s'ils ont les marques énoncées dans la facture d'envoi, et enfin si le cachet du Commissaire des guerres est sain et entier.

Si l'on s'apperceoit que les emballages ne sont pas intacts, ou qu'il y a déficit dans les poids, la vérification et l'ouverture des caisses doivent se faire en présence du Préposé des transports et du voiturier, que le Commissaire des guerres fera appeler à cet effet.

Les déficits et avaries étant reconnus, s'ils proviennent de la négligence ou de l'infidélité du voiturier, le procès-verbal doit faire mention des interpellations à lui faites, ainsi que de ses réponses. Le voiturier et les autres parties présentes signeront ce procès-verbal, dont une expédition est de suite envoyée à l'Ordonnateur en chef, afin de le mettre à même de faire les dispositions nécessaires pour le dédommagement des médicaments manquans et avariés ; une autre expédition est remise au voiturier à qui elle sert de récépissé, lequel récépissé, dans ce cas, ne doit jamais être déposé sur la lettre de voiture ; enfin une troisième expédition reste à l'appui du compte. Si les déficits ou avaries doivent être attribués à des événemens majeurs, le voiturier en justifie par pièces authentiques, lesquelles sont jointes, dans ce cas, à l'expédition du procès-verbal adressé à l'Ordonnateur.

Deux Officiers de santé en chef, ou moins, doivent être appelés par le Commissaire des

guerres pour être présents à l'ouverture des balles, caisses et tonneaux, et procéder ensuite à l'évaluation, d'après le tarif, des déficits ou avaries.

Le Procès-verbal à dresser doit indiquer ;

1. Le nom des parties présentes ;
2. Les numéros des caisses ;
3. La différence de leurs poids respectifs, comparés à ceux portés sur la facture d'expédition sous le même numéro ;
4. L'état dans lequel se trouve l'emballage ;
5. La dénomination et la quantité des médicamens ;
6. L'évaluation, d'après le tarif, tant des quantités reçues, que de celles manquant ou avariées.

ART. 4.

Le Comptable est chargé en recette des médicamens portés sur la facture, comme s'il n'y avait eu ni perte, ni avarie, et le Commissaire des guerres l'autorise, dans le procès-verbal, à se porter en dépense des médicamens manquant ou avariés.

ART. 5.

Chaque versement doit être accompagné d'une facture en double expédition. Après la vérification des médicamens, une de ces factures est envoyée à l'expéditeur avec le récépissé de la partie pesante, mis au bas, et le visa du

Commissaire des guerres ; L'autre expédition reste entre les mains du Comptable, pour être mise à l'appui de la recette, avec le procès-verbal dont nous avons parlé (art. 2 et 3).

ART. 6.

Pour justifier la recette provenant des compositions, il faut faire un relevé exact des compositions faites pendant le mois et inscrites sur le registre. Le relevé doit être conforme à ce même registre et formé, comme lui, de six colonnes avec les mêmes inscriptions.

Les compositions dont le Comptable se charge en recette, étant faites avec ses propres drogues, il doit faire entrer en dépense les drogues qu'il a employées pour ces compositions. Pour obtenir ce résultat, il fera un double de son relevé, et il le mettra à l'appui de la dépense, qui sera constatée par les articles portés à la troisième et à la quatrième colonne de ce relevé.

ART. 7.

La recette des denrées et autres objets fournis par le Directeur, est justifiée par le relevé des objets inscrits pendant le mois sur le registre N. 1 ; ce relevé doit être certifié par le Directeur.

ART. 8.

Pièces justificatives de dépenses.

La dépense a pour objet les médicaments internes et externes, ainsi que les drogues employées pour les compositions.

Pour contrôler la consommation des médicaments livrés, le Pharmacien qui suit la visite, tiendra chaque jour un état conforme au modèle ci-dessous.

Mois de hôpital militaire de

RAPPORT des prescriptions en médicaments, contenues sur le cahier de la visite suivie par Pharmacien Sous aide sousigné, le...

Prescriptions	Totum.	Consommation.		
		Dénomination.	Quantité.	
			Alcool.	En
				Grammes.

Le présent relevé certifié véritable par le Pharmacien de visite sousigné.

Cet état sera rempli exactement par lui d'après les prescriptions du jour, portées sur son cahier, il aura soin d'inscrire à la colonne, Consommation, les drogues et quantités employées pour les différentes préparations.

Le Pharmacien en chef vérifie chaque jour tous ces relevés, et s'assure, si les prescriptions sont conformes à celles portées sur les cahiers, et si les consommations sont d'accord avec les quantités qui doivent entrer dans chaque prescription, d'après le formulaire. La vérification faite, il transcrit fidèlement et journellement les consommations sur l'état à 3e colonne, et il mettra les relevés et les cahiers à l'appui de cet état.

ART. 9.

Les médicaments internes sont prescrits, dans les cas imprévus et d'urgence, par le Chirurgien de garde. Le Pharmacien doit se rappeler que l'administration des médicaments internes est toujours de son ressort; il distribuera lui-même ceux prescrits par les Chirurgiens. Les prescriptions seront inscrites, le soir ou le lendemain, sur les cahiers, en présence des Médecins ou des Chirurgiens qui font la visite des salles où se trouvent les malades aux quels les médicaments auront été administrés; ces médicaments seront portés, pour prouver leur consommation, sur le relevé journalier, dont nous avons parlé art. 8.

ART. 10.

La consommation des médicaments externes délivrés sur les bons des Chirurgiens, est prouvée par le relevé qu'on doit faire de ces mêmes bons. Le Pharmacien comptable, doit faire vérifier et signer ce relevé par le Chirurgien en chef de l'hôpital ou par celui qui en remplit les fonctions, et il mettra les bons à l'appui du relevé.

Le Pharmacien doit savoir, que les bons qui ne sont pas signés par le Chirurgien en chef ou celui qui en fait les fonctions, ne doivent pas être acquittés, puisqu'ils ne lui seront pas al-

loués comme pièces comptables et à décharge, et resteront pour son compte.

ART. 11.

La dépense en composition, est prouvée de la manière indiquée à l'art. 6.

ART. 12.

Dans le cas d'un versement sur un autre établissement, le Pharmacien expéditeur devra être muni de l'autorisation de l'Intendant Général ou de l'Ordonnateur en chef. Il joindra cette autorisation à la facture signée par la partie prenante (art. 5.), et au procès-verbal d'expédition; toutes ces pièces réunies seront produites à l'appui de son compte.

ART. 13.

Mode d'établir la comptabilité.

Le Comptable étant muni des pièces nécessaires pour prouver les entrées et les sorties, il ne lui reste plus qu'à inscrire sur les colonnes respectives de l'état de recettes et dépenses, tous les médicamens et denrées, qu'il a reçus et consommés pendant la mois. Il mettra à l'appui de la recette les pièces dont nous avons parlé aux art. 5, 6 et 7, et à l'appui de la dépense les pièces des art. 8, 9, 10, 11 et 12.

Dans les premiers cinq jours de chaque mois, l'état général de consommation du mois précédent avec toutes les pièces à l'appui, sera remis au Directeur.

Le Comptable doit avoir :

1. Que toutes les pièces doivent être certifiées par le Directeur, et visées par le Commissaire des guerres ;
2. Que les cahiers de visite doivent être sans ratures ni surcharges, cotés et paraphés par le Commissaire des guerres ;
3. Qu'immédiatement après la visite, le Chirurgien et le Pharmacien, qui l'ont suivie, doivent se réunir en présence du Médecin ou du Chirurgien, qui aura fait la visite, pour collationner leurs cahiers et rectifier les erreurs, qui auraient pu s'y glisser ;
4. Que les cahiers doivent être au moins de 12 feuilles liés ensemble, écrits lisiblement, entretenus dans la plus grande propreté et signés à la fin de chaque visite par l'Officier de santé, qui l'a faite, et par ceux, qui l'ont écrite ;
5. Que les pièces qui ne seront pas conformes à cette instruction seront rejetées à la vérification, et mises à la charge du Comptable.

ART. 14.

Le Directeur secondera le Pharmacien en chef dans la formation de cet état de recettes et dépenses, et veillera à ce qu'il ne s'y glisse pas d'erreurs.

ART. 15.

En faisant le compte de sa comptabilité au Directeur, le Pharmacien aura soin de lui faire signer le bordereau de pièces qui la composent. Copie de ce bordereau sera expédiée régulièrement le 5 de chaque mois, au Pharmacien Principal des corps ou de l'arrondissement.

ART. 16.

Les Pharmaciens chargés seulement de la surveillance d'un service, dans les hôpitaux régiez par les Agens des gouvernemens étrangers et dans ceux par entreprise, n'ayant aucune comptabilité à rendre, se borneront à examiner si les médicamens prescrits sont de bonne qualité, et s'ils sont administrés exactement aux malades; si les prescriptions sont remplies avec exactitude, et les préparations faites d'après les principes de l'art. Ils rendront compte à M. le Commissaire des guerres, des inconvéniens qu'ils pourrônt remarquer, et tous les 15 jours, ils feront à leur chef un rapport détaillé sur tout le service pharmaceutique.

Si le Pharmacien chargé d'une surveillance, a sous ses ordres des Pharmaciens-Auxiliaires qui font le service dans l'établissement, il fera faire chaque jour à ses Pharmaciens, les relevés prescrits par l'art. 8, et les inscrira sur l'état n° 30^e colonnes, d'après lequel il établira, au commencement de chaque mois, l'état des consommations qui auront eu lieu. Une copie de cet état, visée par le Commissaire des guerres, sera remise au Comptable du lieu, et une seconde copie sera adressée au Pharmacien Principal avec le mouvement journalier de l'hôpital.

ART. 17.

Demandes en médicaments.

Les quantités des médicaments seront fixées par les Officiers de santé en chef de l'hôpital, et calculées sur la consommation présente de...

Le Pharmacien chargé du service fera un état de demande en double expédition; il inscrira à la tête de cet état le nombre de malades classés par genre de maladies, et existant au moment de la demande. Le Commissaire des guerres visera les deux expéditions, dont une sera adressée par lui à M. l'Ordonnateur, et l'autre sera envoyée au Pharmacien Principal, lequel provoquera toutes les mesures, qui seront nécessaires, pour que les médicaments demandés soient expédiés du dépôt dans le plus bref délai.

En cas d'urgence, les achats des médicaments dont on aura besoin, seront faits, sous l'autorisation du Commissaire des guerres, par les Directeurs qui en feront la remise au Pharmacien en chef de l'hôpital, par le même procès-verbal qu'on aura dressé pour constater la réception, et qui, par conséquent, n'en seront point comptables.

Les Pharmaciens Principaux doivent examiner si les demandes et les consommations sont en rapport avec le nombre des malades.

Pour être à même de remplir cet objet, autant que possible, les Pharmaciens comptables auront soin de leur envoyer, le 5 de chaque mois, avec le bordereau des pièces transmises au Directeur (art 15.), l'état de recette et dépense concernant les médicaments existant au commencement du mois, ceux reçus pendant le mois, et ceux qui ont été consommés. Ils inscriront sur cet état le nombre de malades existant au commencement du mois et classés par genre de maladies.

Ils rendront un compte exact de tout leur service, tant pour le matériel, que pour le personnel.

Les Pharmaciens Principaux auront soin de transmettre au Pharmacien en chef de l'armée, dans les dix premiers jours de chaque mois, un tableau contenant les différents renseignements qu'ils auront reçus avec leurs observations sur les différentes parties du service.

ART. 18.

Dans le cas d'un service extraordinaire de malades, les Officiers de santé en chef se concerteront pour faire une seconde demande calculée d'après les nouveaux besoins effectifs ou présumés, et ils se conformeront à tout ce qui a été prescrit pour la première demande (art. 17).

ART. 19.

Il est défendu au Pharmacien, sous quelque prétexte que ce soit, de s'immiscer dans l'achat des médicaments, il doit se borner à vérifier avec ses collègues, les qualités et les quantités qui lui sont remises.

ART. 20.

Les Officiers de santé en chef auront soin de ne comprendre dans leur demande que les articles portés dans le formulaire, et de s'y conformer dans leurs prescriptions.

ART. 21.

A la fin de chaque mois, les Officiers de santé en chef de l'hôpital signeront, après l'avoir vérifié et s'être assurés de son exactitude, le bordereau de consommation des denrées employées au service de la pharmacie: ce bordereau doit être établi et présenté par le Directeur, pour être ensuite joint à l'appel de son compte de consommation.

ART. 22.

Dispositions générales.

A la fin de chaque année et lors de la coupe des exercices, chaque Pharmacien chargé d'un service, doit faire l'inventaire général des médicaments.

Lorsqu'un Pharmacien comptable reçoit une autre destination, il ne doit s'y rendre qu'après avoir fait la remise de son service à son successeur, et de son compte au Directeur.

Cette remise a lieu sur inventaire contradictoirement dressé en présence du Commissaire des guerres et de deux Officiers de santé en chef. Une expédition de cet inventaire est envoyée, sur le champ, à l'Ordonnateur en chef, et les deux Comptables en gardent chacun une pour les rapporter à l'appui de leur compte respectifs.

Les Pharmaciens doivent se rappeler, qu'aux armées, l'autorité de S. E. le Ministre-Directeur de l'administration de la guerre, lorsqu'elle doit intervenir dans les cas prescrits par le règlement, est remplacée par celle de M. l'Intendant Général ou de l'Ordonnateur en chef.

ART. 23.

Compte en valeur.

Dans toutes les pharmacies, soit d'hôpitaux, soit d'ambulance, on suivra pour l'évaluation

des drogues et médicamens que doivent présenter les comptes de recette et de dépenses, les prix du tarif arrêté par S. E. le Ministre-Directeur.

Lorsqu'on ne pourra pas se procurer le tarif ministériel, ce qui peut arriver souvent à l'arsenal, on établira la comptabilité en nature, et on laissera en blanc les colonnes des valeurs, qui seront ensuite remplies à l'arrivée du tarif.

ART. 24.

Le Commissaire des guerres fera connaître aux Pharmaciens le rapport existant entre les poids et mesures du pays, et les poids et mesures métriques. Le rapport comparatif, signé par le Commissaire des guerres, devra être accompagné du procès-verbal par lequel ce rapport aura été constaté, et sera mis à l'appui du compte.

ART. 25.

Le Directeur doit fournir au Pharmacien les imprimés ci-après :

1. Les cahiers de visite;
2. L'état à 30 colonnes;
3. L'état général pour établir les recettes et dépenses;
4. Le relevé du registre aux compositions;
5. L'état de demande;
6. Le bordereau des dépenses de la pharmacie.

Les Discrets feroient toute la diligence possible pour se procurer ces imprimés, ainsi que le tarif des médicamens : on ne doit pas ignorer que le défaut des imprimés, surcharge les Pharmaciens d'un travail pénible et long, et souvent est la cause du retard et surtout du désordre qu'on remarque dans la comptabilité des armées. Il faut aussi observer que les mutations individuelles commandées par des circonstances impérieuses, et qui ont lieu continuellement aux armées, ne donnent pas aux Pharmaciens le tems nécessaire pour tracer ces pièces à la main.

Fait à Erfurt, le 22. mars 1812.

*Le Pharmacien en chef de la
Grande Armée,*

... LAUBERT.

*Vu et approuvé par le Général
de division, Conseiller d'état,
Intendant Général de la Grande
Armée,*

à Berlin, le 22. Avril 1812.

Comte Dumas.





567

